













Rx: Salis abrinthij ʒi  
~~ma~~ ex cochleari uno  
 succi limonum, mand &  
 seruo sumendum. inter  
 medijs & temporibus: cochle-  
 aria aliquot & q. Montan  
~~lodequaga~~ bis quāq;  
 hora propino

50487/A

Salt of steel.  
 a compound salt.

Rx: Salis abrinthij ʒi  
 ex cochleari uno  
 succi limonum, mand &  
 seruo sumendum. inter  
 medijs & temporibus: cochle-  
 aria aliquot & q. Montan  
~~lodequaga~~ bis quāq;  
 hora propino



Ol. succini  
in spagmis

pret. 1: 6.

Griffiths

In cardialgia. heart b.  
℞ of calycate water (a simp.  
milk water, or Borrage aq) 3; or  
4 pints. dissolve in every draught  
a 3 of  $\frac{1}{2}$  bitter salt 4 or 8 times.  
and drink it cold.

of ans: put in

℞ of Rhubarb 3ss.

Judon's: / *Stirax Androm.*  
quart: nucis a  
vaccina

~~Handwritten scribbles and crossed-out text at the bottom of the page.~~

<sup>℥. iij</sup>  
Mithra. ℥i. sal. tartar ℥i. <sup>ss</sup>  
Aolis. cron. ā: ℥i.  
Sp. Vin. lb ii

---

Aq. Lactis alopecur.  
Card. Benedict. Ulmar.  
Galeg. ā M vi.  
Menth. Absinth com. M. v. ā.  
rutæ. M iij  
angel. M ij. contus. addde  
lactis cong. iij. distil. organ.  
commun



Benjamin. ℥i. storax ℥ij.

Pulvis Latrum  
an excellent remedy  
in green sickness.

In Catarrhem.

℞. Aq. pulg. ℥iij  
Syr. pavis rhœas ℥iij

sumat 3. Spoonfulls  
3. vel. 4. in die: & nocte  
4 spoonfulls

Contr. Rheumatismum.  
Psicot. trifol. aq.



R 3 pints of Spring water  
one of milk, Boil it a little  
then pour it upon a hard  
toast. Drink it cold.

---

R. one Spoonful of  $\frac{1}{2}$  shav-  
ings of Horse-Radish-root  
12 leaves of Scurvy-grass.  
20 raisins stoned, put em  
into a quart of Beer, let  
them stand close stop'd  
all night, drink of it the  
next day, at Meals & at  
any other time. This  
has done much good in the  
Scurvy.

---

Emoticū in Hebr. & Syderham.

R. Infus. croc. metall. 3vi.

oymot stillat. &

Syr. Scabios. compos. a  $\frac{1}{2}$  ss.

Ung. Scabies.  
Nutrit. ℥iij Sulphur.  
vivi ℥iij Misco.  
Oil.

Ung. nicotian. ℥iij.  
Sulp. vivi. ℥i. Misco.

---

℞. Cort. porru. subtil. pulv.  
℥i.

rad. gent. pulverizat ℥ij

sal. abinth. ℥ij.

Syrup. de micon. ℥iij.

m. f. Elect.

de quo capiat quantitate  
nucis Moschata major. hoc a  
quodq<sup>tra</sup> 3. superbibendo. haus-  
tulum decoct. amari sine purga-  
tione incipiendo, per se uno  
recedente.

The bitter ingredients  
to be steeped in 2 quarts  
of white wine.



Hypnotica ~~hanc~~ suo noctem,  
vel hora somni exhibendum  
post vomitionem in febre &  
sudorem.

R. aq. papav. rhæad. ℥ij  
aq. Mirabol. Syr. de  
mecon. ā. ℥ii

Syrup. papav. errat. ℥ii.

M. f. haustus

Diascordium præclarum  
in edamantu, modo eā quantitate  
exhibetur, quæ remediij potius  
quam tituli mensurā impleat.

Contra Asthma.

R. Decoct. pectorat. lib.

Oxymel Scillitic. VI.

Syr. capill. vener. ℥ij

Bibat ℥iij singulis Auroris  
Pitt.



*℞ hordii mundat. ℥i*

*uvae. passul. ℥i.*

*ficiū — n<sup>o</sup> 8.*

*dactylor — n<sup>o</sup> 8.*

*myrs. robustans 15.*

*licoritra — ℥ii.*

*cap. Vener. 0*

*(Russilag.)*

*Hyssop. (an. pugil. 1.)*

*Scabiosa*

*to be Boild in 3 pint of  
spring water to a quart.*

*you may add to it*

*cal prund. ℥i.*

*Syr. capit. Ven.*

*Russilag. a. ℥i.*

*vel.*

*Syr. pectoral.*

*in asmat. add som anis*

*Decoct. pectoral.*

---

Tractatus, ( cui Titulus, *Processus  
Integri in Morbis terè Omnibus  
Curandis* ) à Clarissimo D. D.  
*Thomâ Sydenham* Conscriptus  
Imprimatur.

*Thomas Burwell*, Præses.

*Humphrey Brook,*  
*Jos. Clerk,*  
*Gulielmus Briggs,*  
*Fredr. Slare,* } Censores.

Datum 18<sup>o</sup>. Die Augusti  
A. D. 1693. in Comi-  
tiis Censoriis ex Ædi-  
bus Collegii nostri.

---

58375

Processus Integri  
I N  
M O R B I S

Feiè Omnibus

C U R A N D I S,

A Do. *Thoma Sydenham*, M.D.

Conscripti.

Quibus accessit graphica Sym-  
ptomatum delineatio, unà cum  
quamplurimis Observatu dignis.

N E C N O N

De *Phthisi* Tractatulo

Nunquam antehac Editio.

---

L O N D I N I :

Impensis *Sam. Smith & Benj. Walford*,  
ad Insignia Principis, & *J. Knapton*, ad  
Insigne Coronæ in Cœmeterio  
D. Pauli. 1 6 9 5.





---

---

## *Amice Lector,*

**S**pecimen habes Praxeos eximiae, in dilectissimi filii M. D. usum, cautè & diligenter excogitatum, suâ ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritate ista qua omnes excepit, concessum à *Cl. Sydenham*, Viro sanè cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modo in arte sua mirâ sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo : sed & probis moribus, & in humanum genus, studio & amore insignibus adeo, ut apud omnes summum suî reliquerit desiderium : Cujus præcepta licèt animo meo & imo pectore infixæ sint, ne tamen fortè fortunâ in mei ipsius & ægrorum detrimentum excidant memoriâ parùm fidâ, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoq; inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter *Miscellanea Curiosa* superioris anni Norimbergæ editum ; sed ineptâ mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum ut tibi sit in quovis loco paratum ; figmentis cerebri vanis & futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refertum, nec hypothese placidâ solidis

ut videtur rationum momentis undequaque  
constipatâ superbiens ; humile autem & mo-  
destum accuratè morbos depingit, & accura-  
tiùs adhuc medetur ; in id solum sollicitum  
ut innotescat quod natura faciat aut ferat.  
Et si verum loqui liceat, modo partium situs  
noveris, pateant tibi per Symptomata ægri-  
tudines, (quod assiduâ ediscas observatione)  
scias deinde veram & genuinam medendi  
methodum per diætam & Pharmaciam adhi-  
bere, sælicitissimus eris practicus, & tibi & in-  
firmis optimè consulēs. Parùm interim tuâ  
refert utrum Alkali peccet an Acidum, num  
in Spiritibus Animalibus, an in ipso sanguine,  
aut in recondito aliquo Viscere delitescat  
morbi minera ; unde de Periodico Intermit-  
tentium reditu doctè satis & prolixè possis  
differere ; dum interea ipsa Febris sine ullis  
ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsu  
celeri, nausçâ, cæterisque Symptomatis etiam  
astantibus palam est, & apertè dignoscitur :  
Hinc sæpius mirari subit, quamobrem anxie  
ita & scrupulosè immediatas & proximas  
morborum causas, dum Medicinam pertra-  
ctandam suscipiunt, indagare satagunt, & è  
tenebris istis, quibus natura obduxit, irritò  
licet conatu, eruere, gravi & subactò  
iudicio viri, & in praxi versatissimi ; satis in-  
terim gnari se latere vel quævis obvia ; unde  
enim dimanat graminis viridis, aut albus ni-  
vis color ? Quid est quod humana anima ra-  
tiocinari

tiocinari nequeat dum adhuc Infantes aut Pue-  
ri sumus ? Unde forma tua Specifica ? Sati-  
us esset Medicum quam Philosophum agere. (quis  
enim unquam Cartesium sibi Medicum vo-  
luerit) minutissima Phænomena planè & ri-  
è enumerare, & remedia quibus unusquisque  
morbus faciliùs cedat, candido & sincero ani-  
mo proponere; ita tandem limites suos præter-  
gressa, quibus angustis nimis jam includitur  
ars nobilissima, omnibus, quaquaversum pa-  
ret orbis, sæliciter satis & prosperè salutem,  
filiis autem suis honores summos conciliabit.

Meditabatur paulo ante obitum tractatum  
de Pthisi peritissimus medicus; in perqui-  
rendo, naturæ methodum, qua morbos amo-  
liri studet, ut adjutrices porrigeret manus, &  
miseriis hominum subveniret, diu noctuque  
pensitabundo, & anxio animo, exercitatissi-  
mus; hinc fidiissimarum observationum serie  
& irrefragabili edoctus experienciâ, medicinæ  
praxin ornavit, & ad saniores reduxit regu-  
las; sed væ tabidis, dum hujusmodi nun-  
quam intermissis studiis detenti & defatigati  
spiritus, solitis non vacabant, excubiis, trucu-  
lentissimus hostis, *Podagra*, quæ per multos  
annos obsederat, & debilitaverat artus, impe-  
tu facto in interiora viscera irruit, per vomitum  
& secessum enormiores intentans mortem,  
unico autem morbo nescit cedere Medicorum  
Princeps, sed cum malorum cumulo accessit  
& *Renum Calculus*, qui corrasit vasorum os-  
culis,



culis, sanguinem liberaliùs, quam senectus tulit, urinæ permixtum effudit, se jam non amplius opponens, nec vitæ, nec mortis cupidus, placidam, & pacatam, expiravit animam. Ne tamen auxilio prorsus destituatur tabidi fragmenta quædam quæ autorem ubivis sapiunt in primo saltem morbi stadio plerumque proficua, (neq; enim fas est, quod ægrotanti proximo opitulerur, celare,) in publicum prodeunt, ut exindè pateat quam accurata, & omnibus numeris absoluta, si modo Deus Opt. Maximus concessisset vitam, expectari potuisset Phthisiologia.

Quid in Febribus, Variolis, Morbillis, acutis cæteris, ut & Chronicis sanandis valuit optimè meritis autor noster, sequentes indicant paginae. Regimen & Diæta instituuntur apertissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria; nec in Pharmacopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse sitim suam restinguere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim & pro libitu hauriendam, unde mirè reficiuntur & refrigerantur, concedit; nec immanitate plus quàm barbarâ, precibus eorum surdus, Apozemata & Julapia præ ingrato sapore fastidita substituit; maximam adhibet cautelam ne exæstuans nimis, vel igne luculentiori, vel stragulorum onere, plus adhuc incalesceret, vel à propinatis forsan remediis eum in finem ut  
per



per poros eliminetur materia morbifica cruda  
adhuc & inconcocta, quæ tamen hâc datâ  
ansâ concitato motu cerebrum petit, unde  
Phrenetis aut Coma, aut extravasato san-  
guine deturpant cutim maculæ purpureæ,  
aut eruptiones quas vocant miliares collum  
& pectus ubivis obsident. Nunquid ad a-  
nimisim magis depingi poterat quam Vario-  
larum historia? eruptionis diem in utraque  
specie designat, pustularum ingenium ad un-  
guem describit, quo tempore incipiat, &  
quamdiu continuetur Salivatio, quo iterum  
faciei manuumque tumor se predat, quid  
tandem quolibet die expectandum diseritè  
explicat. Paregoricorum usum, quo emo-  
lumento judicent Practici, primus persuasit,  
malum, ingerendi Cardiaca ante eruptionem,  
morem, unde sæpe accersitum fuerit conflu-  
entium genus, meritò primus improbavit.  
Melius autem hæc ex ipso fonte. Valeas  
itaq; amice Lector, & sicubi scateant Mendæ  
ignoscas.

*S. M.*

Amico

Amico suo Integerrimo M. D.  
Expertissimo Domino S. M.

*S*olum sequaces prætulimus diu  
Cum Medentes ; Compar habebitur  
Qui clariorem te, minori  
Reddidit hoc, Medicina ! Libro.

Non hic tumentì Mole superbiens -  
Blattis futurus Præda opulentior :  
Sensu sed arcta Ditiori  
Conciliant sibi Verba Pondus.

Frustra molesto vasta Volumine  
Lustres Galeni scripta ; Minutula  
Acumen huic majus Tabellæ ;  
Se stupet hic Medicina totam.

Hic non remoto sordidus Angulo  
Sensim fatiscet ; Sedula strenuè  
Manus quotannis, Spe perenni  
Deteret, auctior ut resurgat.

Applaudè Votis Turba Medentium :  
Non Febris illum, Morbus atrocior  
Haud afflet ullus ; Commodis qui  
Immoritur satagendo Vestris.

Sic Vovet,

Christophorus Crelle, M. D.

# I N D E X.

<b>A</b>		Febre Constitutio-
<b>D</b>	DE Abortu Præ-	num variarum, 16
	cavendo P. 64	Febribus à dentitione
Ambustis	87	ortis 82
Angina	30	Febre depuratoria, 12
Apoplexia	46	Febre Erysipelatosa,
Asthmate	92	28
<b>C</b>		Febre Hæctica Infan-
Canis rabidi morfu,		tum 82
	90	Febre Intermitt. 16
Chlorosi	84	Febre Pestilentiali, 14
Cholera Morbo	56	Febre Scarlatina, 22
Chorea sancti viti,	44	Fluore albo 76
Colica biliosa	55	Furfure sive Porri-
Colica Hysterica, 61		gine capitis 90
Colica Pictonum, 58		<b>G</b>
Contusionibus	89	Gonorrhœa virulen-
<b>D</b>		ta 70
Diabete	77	<b>H</b>
Diarrhœa	51	Hæmoptoë 85
Dysenteria	ibid.	Hæmorrhagia nari-
<b>E</b>		um 83
Epilepsia Puerorum,		Hæmorrhoidum do-
	79	lore 78
<b>F</b>		Hæmorrhoidum flu-
Febre Stationaria, 19		xu immodico, 79
		Hyz



Hydrope 66

Hypochondriaca affectione 5

Hysterica Passione, ibid.

I

Ictero 63

Iliaca Passione 58

L

Lochiorum fluxu immodico 64

Lochiorum suppressione 65

Lue Venerea 74

M

Mania communi, 88

Mensium fluxu immodico 60

Mensium suppressione 85

Mictu Sanguineo à Renum calculo, 50

Morbillis 32

N

Nephritico Paroxysmo 49

O

Ophthalmia 48

P

Paralyfi 93

Peripneumonia notha, 25

Phthifi 93, 98

Pleuritide 23

Pruritu ferino 30

Punctura tendinis, 87

Podagra 102

R

Rachitide 80

Rheumatismo 26

Remediorum formulæ 1

S

Scorbuto 96

T

Tussi 93

Tenesmo 51

Tussi Puerorum convulsiva 83

V

Variolis 34

Ulcere Vesicæ 91

Vomitu sanguinis, 85

Uteri procidentia, 49



*Medicamentorum quædam formulæ in praxi magis familiares.*

*Potio Communis Purgativa.*

℞ **T** Amarind. ʒʒ. fol. Sennæ ʒij. Rhei. ʒiʒ, coq. f. q. aq. ad ʒiij. in Colatura dissolve Manna & Symp. R̄sar. solut. an. ʒj. m. f. Potio.

*Emeticum Commune.*

℞ Aq. Cardui Benedict. ʒij, Infus. Cere. Metal. ʒj. Syr. Caryophyll. ʒʒ, m. f. vomitorium. Sumat horâ 4<sup>a</sup>. Pomeridianâ, imperbibendo post singulas vomitiones hauriam largum liquoris possatici.

*Julapium Dolens.*

℞ Aq. Cerasor. nigre. lēss. d. cæteris q. d. aq. Cinnamon lēssat. ʒj. Margarit. præpar. ʒiʒ, sacchar. Cassiâ. q. f. add. aq. R̄sar. Damascen. ʒij, f. ʒij. q. d. q. d. p. cocturâ iv. vel v. in languoribus.

**Julapium Cardiacum.**

℞ *Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ℥ij, aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri, an. ℥ss, m. f. Julap. de quo capiat sæpius.*

**Decoctum Diætericum.**

℞ *Rad. Sarsaparill. ℥vj. lign. Sassafr. & Chinæ ana ℥ij. Glycyrrhiz. ℥j, coq. in aq. font. Congiis ij. per horæ dimidium; deinde stent clausè super cineres calidos per horas xij. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem; Cum primum ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi. ℥ss, post duas horas coletur, & postea depuretur per residentiam. & liquor reponatur lagenis vitreis probè clausis ad usum. Sit pro potu ordinario per xxx, dies.*

**Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.**

℞ *Rad. gramin. Cichor. Fænicul. & asparag. ana ℥j, uvarum Corinthiac. & passul. enucleat. an. ℥ij, fol. hepat. ling. cerv. & cap. Ven. an. M. j. fol. Beccabung. sub finem addit. M. ij. coq. s. q. aq. fontan. ad ℔ij, sub finem adde vini Rhenani ℔ss. Colaturâ adhuc calente, infunde ad duas horas, vase clauso, Cochlear. hortens. M. j. colatur. adde syr. è quinq; radic & è succo Aurant. ana ℥ij. aq. Cinnamom. hordeat. ℥j, M. f. Apozema. Sumat ℔ss, manè & 5<sup>a</sup> pomeridianâ per xiv, dies.*

**Elegma**

## Eclegma Incrassans in Tussi.

**R** Ol. Amygd. dulc. ℥j. Syr. Papav. Rhead.  
Portulac. Fufub. & Lobee sani, ana ℥ss, Sacchar.  
crystall. q. s. M. in mortario marmoreo ad integre  
horæ spatium, & f. Linctus perfectè mistus;  
recondatur in olla figulina, ad usum. Cap. læ-  
pius lambend. & baculo Liquiritiæ.

## Eclegma fortius incrassans.

**R** Conseru. Ros. rub. Syr. violar. & de Me-  
con. an. ℥j. sem. papav. alb. ℥iij, contundan-  
tur simul & per setaceum trajiciantur, dein lè  
adde al. nuc. mac. bat. express. gr. vj, f. Eclegma.

## In Defusione renui.

**R** Conseru. ros. rub. ℥ij. Syr. de Mecon.  
& Fufub. an. ℥j. Oliban. Mastich. & Succin.  
an. ℥j. al. nuc. Mac. bat. per expressionem gr. vj.  
M. f. Lobeoh. de quo lambat læpe; bis in die  
cap. eclegm. descript. cochl. j, in stilland. Bal-  
sam. Sulphur. Anisat. à gut. viij, ad gut. xij.

## Cerevisia Purgativa.

**R** Polypod. Querc. ℥ij, Rad. Rhabarb. Mo-  
nach. fol. sennæ & passul. enucleat. ana ℥ss,  
Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. an.  
℥iij, fol. Cochl. hortens. salo. an. M. iv. Au-  
ramior. incis. N° iv. infunde in Congiis v, vel  
vj, Cerevisiæ non lupulatæ, fermentationis temp-  
re, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro



potu ordinario per dies *xiv*, vel *xxj*, præcipuè verò sumat haustum singulis Auroris.

### Emplastrum Hystericum.

℞ Galbani in tinctura Castor, solut. ℥ co-  
lat. ℥iij, Tacamahac. ℥ij, f. Emplast. pro um-  
bilico.

### Catharticum pro Infantibus tenellis.

℞ Syrup. Cichor. cum Rhabarb, Cochl. j,  
parvulum.

### Decoctum Amarum Purgativum.

℞ Decoct. amar. duplicatâ senâ ℥iv, Sy-  
rup. de Spina Cervina ℥j. Elect. de Succ. Ro-  
sar. ℥ij, M. f. Potio.

### Laudanum Liquidum Authoris.

℞ Vini Hispanici ℥vj. Opii ℥ij. Croci ℥j. pulv.  
Cinnamomi, & Garyophyllorum, an. ℥j. infundan-  
tur simul in B. M. per duos vel tres dies, donec  
liquor debitam consistentiam acquirat; Cola-  
tura servetur pro usu.

*De aff. Elione, in feminis, hysterica; moribus, hypochondriaca dicta.*

CUM à casu aliquo graviore molestim patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; urina subindè limpidissima copiosè excernitur; sanitatis recuperandæ spes omnis prorinus abjicitur, & trillissima quævis sibi ominantur agrotæ; quamcunque corporis partem morbus insederit (plurimas autem insidet) symptomata ei parti competentia confestim urgent; in capite apoplexia, hemiplegiâ soluta, statim à partu adoritur; spasmi epileptici per similes (vulgò uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versùs intumescunt) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice polsis contegere, agnâ interim materiam viridem bili porraceæ partem evomente, miserè excruciat; cordis palpitacionem, nullam passionem iliacam & colicam, nephritin, urinae suppressionem æmulatur pa-

roxyſmus; vomitiones enormes, diarrhœam ſubinde excitat; externè in carne muſculoſa nunc dolorem nunc tumorem inducit in tibiis hydropiſ inſtar; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes; dolor doſſi creberrimè ſævit; & ſæpe ſæpius aded refrigerantur externæ partes, ut cadaver planè referant; in riſum & lachrymas effuſiſſimas ſine ulla *ωρεξησι* indikè erumpunt; pryaliſmus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio delibutas facilè crederes. Dolores hyſterici, quamcunq; partem obſident; ubi diſceſſerint, teneritudinem, quæ tangi recuſat, relinquunt, ac ſi verberatæ fuiſſent carnes.

Mittatur Sanguis ad *ʒviij*.

*Emplaſt. de Galbano* umbilico admoveatur. Sequenti manè aggrediatur uſum ſequentium pilularum;

*Rx Pil. Cock. maj. ʒij, Caſtor. pulv. gr. ij. Baſam. Peruv. gutt. iij. f. Pil. xij. Cap. iv.* ſingulis vel alternis matutinis, pro ratione virium, horâ 4<sup>a</sup> vil 5<sup>a</sup> matutinâ, ſuperdormiendo.

*Rx Aq. Rutæ ʒiv. Bryon, comp. ʒij. Caſtor. nodulo ligat. & in vitro ſuſpenſ. ʒʒ, Sacchar. Cryſtal. q. ſ. f. julap. de quo capiat cochl. iv, vel v, in omni languore. Poſt has pilulas ſumptas utatur ſequentibus;*

*Rx*



℞ *Limatur. Chalyb. gr. viij. cum f. q. Extract. Absinth. f. Pil. N° iij.* Sumat summo mane, & repetantur horâ 5<sup>a</sup> pomeridianâ per xxx dies, superbibendo haustum Vini Absinthitis.

Sin forma boli magis artideat.

℞ *Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. flaved. Aurant. an. ℥j, Angelic. condit. Nuc. Moschat. condit. & Theriac. Andromach. an. ℥ss, pulv. Ari comp. ℥iij, Zingib. condit. ℥ij, cum f. q. Syrup. de succ. citr. vel, ejus defectu, Syr. Aurantior. f. Electuarium.*

℞ *Elect. præscript. ℥ij, limatur. Chalyb. gr. viij. cum f. q. Syrup. Aurantior. f. Bolus* sumendus mane & sero, superbibendo haustum vini absinthitis, vel *Cochl. vj seq. Infusionis.*

℞ *Rad. Angelic. Enul. campan. & Imperator. an. ℥j. fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. & Chamædr. an. M. j. Cort. Aurant. duor. incis. affunde vini Hispanic. q. s. ad supereminentiam duorum digitorum. Coletur tempore usus. Vel,*

In Delicatulis *Chalybs* exhiberi poterit in forma pulv. sequentis ;

*Rx* Limatur. Chalyb. probè trit, ʒj, pulv.  
*Ani* comp. ʒvj, sem. Coriand. præparat. Anisi,  
 Fench. dulc. an. ʒss. Cinnamom. acutiss. Co-  
 rall. rubr. præparat. an. ʒiij, Nuc. Moschat.  
 ʒij, f. omnium pulvis subtilissimus, cui adde  
 sacchar. albiss. ad pondus omnium, hujus cap. &  
 Cochleari ʒss, bis in die per 4 dies, tum ʒj,  
 bis in die per 40 dies, superbibend. Cochl. vj,  
 seq Julap. vel vini Absinthitis.

*Rx* Aq. Lact. Alexeter. ʒxij, Gentian. comp.  
 ʒiv, Absinth. magis. comp. ʒij, sacchar. albiss.  
 q. s. f. Julap. Vel ;

*Rx* Vini Rhenan. Absinth. ʒss, aq. Gentian.  
 comp. ʒij. Syr. Caryophyll. ʒj, f. Julap.

*Rx* Myrrh. elect. Galban & Asie fetide, an.  
 ʒj, Castor ʒss, cum s. q. Balsam. Peruv. f.  
 Pil. è singulis drachmis xij. Sumat iij, singulis  
 noctibus, superbibend. aq. Bryon. compos.  
 Cochl. iij, vel iv, per totum decursum hujus  
 processûs.

Si Pilulæ Præscriptæ ventrem moverint,  
 tratur sequentibus;

*Rx* Castor. ʒj, sal. succin. volatil. ʒss, cum  
 s. q. extract. Rutæ, f. pilula N° xxiv. Cap.  
 iij. singulis noctibus, superbibendo Julapii  
 hysteric. Cochl. iij. vel iv.

*Sp.*

Sp. C. C. ad gutt. *xvj.* vel *xviij.* in aqua caliqua appropriata sæpius exhibitus valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas;

*℞ Trochisc. de Myrrh. pulv. ℥j. Balsam. sulphur. Terebinth. gut. iij. cum s. q. gumm. Ammoniac. solut. f. Pil. N° iij. Cap. manè & serò superbib. Julap. hyster. Cochl. iij. vel v. instillando Sp. C. C. gutt. xij.*

*Electuarium Antiscorbutic. cum aqua ibidem descripta prodest in his affectionibus, ut & Electuar. corroborans cum additione Consero. Cochl. hortens. & pulv. Ari Compos. ℥vj. superbibendo præscriptam aquam.*

At si affectus his non cedat remediis, cundum est ad aquas ferreas; & si neq; his, tum ad Sulphureas, quales sunt *Bathonienses*.

Iner bibendum aquas ferreas hoc observanda; si aliquod Symptoma gravior acciderit, quod potationi aquarum inferri potest, tunc ab eis æger abstinere, donec Symptoma illud penitus evanuerit. Ager in eorum usu per sex septimanas ad minimum, vel potius ad duos menses perseveret. *Zingiber cardium, vel Semina Carni Saccharata*, ad calefaciendum ventriculum subinde sumat. *Pilule etiam hysterica iij.* devorari possunt per primas x. noctes, superbibendo *Julap. hyster. cochl. iij. vel v.*



Quoad usum *aquarum Bathoniensium*, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per sex septimanas vel duos menses.

Si *Chalybs* iusto plus corpus calefaciat, tum per ejus usum, quartâ quâq; Aurorâ sumat *aq. mineralium purgantium* *℥iv.* Quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut solent Cathartica ex officinis deprompta.

Si *Chalybs* magnas perturbationes inducat, Laudanum *aq. aliquâ hystericâ* mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cum à morbi diuturnitate fractæ & attritæ fuerint vires, venæsectio, & cathartica non sunt præmittenda, sed à Chalybe statim incipiendum.

Ubi Symptomata sunt mitiora, satis est sanguinem mittere, & alvum solvere ad dies *iii.* vel *iv.* dein. pilulas hystericas ad dies *x.* manè & serò exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, & *Diarrhœa* enormioribus, exhibendum Laudanum, & postea corroborandi spiritus, at modò per vires liceat, ante usum Laudani, educatur è venis sanguis, & Catharticum propinetur: in viraginibus præsertim, & sanguineo temperamento præditis, in debilioribus autem, & haud ita pridem paroxysmum passis, sufficit ventriculum Congio uno lactis cerevisiati hausto,

hausto, & mox per vomitum rejecto detergere, dein largam dosin *Theriac. Androm.* vel *Elect. Orvietan.* imperare, & *Cochl.* aliquot, liquoris alicujus Spirituosi, cum pauculis Laudani liquid. guttulis, superbibenda, dare. Quod si ægra jampridem vomuerit, & ulterius emeticis sollicitare periculo non vacabit, Laudanum sine mora propinandum est, eâ dosi, quæ Symptoma vincat, & post singulas vomitiones toties quoties repetendum, in forma potissimum solida, vel in liquida, in parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in *cochl. j.* aq. *Cinamon.* fortior. ægrâ interim conquiescente, & caput immotum tenente.

Perdomito Symptomate, manè & serò, ad dies pauculos continuetur usus Laudani.

Hæc duo diligenter notanda, quod cum semel post evacuationes Laudano uti cœperimus, eâ dosi, atque illâ toties repetitâ, sumendum est, donec Symptoma omnino fuerit debellatum, interjecto tantum spatiolo inter singulas doses, ut quid prior præstiterit ante noscamus quam alteram ingeramus, deinceps cum Laudano morbum aggredimur, nihil movendum est, nihil evacuandum vel per mitissimum enema.

*Theriaca Andromachi* crebro, diuq; usurpata, magnum est in hoc, & aliis morbis quamplurimis à caloris, & convectionis defectu ortis, remedium.

Vina

*Vina Hispanica* gentianâ angelicâ absinthii. centaurio, corticum arantior. flavedine, aliisq; corroborantibus infusis medicata, si ad aliquot Cochlearia ter in die potentur admodum conferunt, modo ægra tenui non fuerit biliosoque corporis habitu.

*Cortex Peruv.* ad ℥j. manè & serò, per septimanas aliquot deglutitus, præsertim in spasmodicis hysteris miras habet vires.

In tenui biliosoque corporis habitu possit usurpari Diæta lactea, præcipuè in Colica Hysterica, si modo ea incommoda possint superari, quæ primis ferè diebus apportat, quod nempe tum in ventriculo coaguletur, tum etiam viribus corporis, in statu conservandis, sustendandisq; minus sufficiat.

Nihil tamen æque sanguinem spiritusque fovet, & confirmat, ac diu multumq; singulis ferè diebus equo vehi, nec itinera in curru facta suo carent successu.

*De Febre Depuratoria annorum 1661, 62, 63, 64.*

Si æger juvenis sit extrahatur sanguis è brachio, & eodem die post aliquot horas vel sequenti die duabus horis post leve prandium, *Emeticum ex infus. Croc. Metall. paratis Zythogal. ℥vj. vel viij.* ut quoties vomuerit, aut alvum exoneraverit, è vestigio sumatur haustus, exhibeatur; & post finitam operationem Emetici, hoc vel simile paregoricum.

R 49.



*R* *Aq. Cerasor. nigr. ℥ij. aq. Epidem. ℥ss.*  
*Laudan. liquid. gutt. xvi. Syr. Caryophyll. ℥is.*  
*M. F. Haustus.*

Vomitoria ex infus. *Croc. Metall.* parata, puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minimâ quantitate, non est tutum exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum vel duodecimum singulis Auroris injiciatur enema sequens ;

*R* *Decoct. commun. pro Clystere ℥ij. (vel lactis vaccini eandem quantitatem) Sacchar. Culinar. & Syrup. violac, an. ℥ij. f. Enema.*

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quo materia febrilis citius concoquatur, ad quem etiam finem Cardiacâ moderata his ultimis diebus exhibita apprimè conducunt ; ut,

*R* *Pulv. è Cochl. Cancror. comp. gr. xiv. Elect. de Ovo ℥ss. cum s. q. Syr. Caryophyll. f. Bolus sumendus octavâ quâque horâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. v, vel vj.*

*R* *Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ℥iij. Aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. an. ℥i. M. F. Julap. vel alia his similia.*

Hac methodo sollicitè observatâ, usitatò circa xv. diem (cum ex laudabili in urina separatione,

paratione, tum ex manifesta Symptomatum omnium remissione) tempestivum esse Portionem Purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum maximè in Senibus, curatâ Febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valdè debilem esse, & quandoque tussi, interdum etiam screatu, magnam glutinosi viscosique phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immisso, bibat æger.

Si superveniat Iliaca passio, præscribatur Sal. Absinth.  $\mathfrak{z}j.$  ex Coch.  $j.$  Suc. Limonum, manè & Serò, intermediis temporibus cap. Aq. menth. stillatit. sine Saccharo, Coch. aliquot, bis quâq; horâ, dum hæc fiunt, catulus vivens nudo ventri indefinenter accumbat, postquam dolor cum vomitu, per biduum triduumve cessaverit, exhibeatur *Pill. Coch. maj.*  $\mathfrak{z}j.$  in *Aq. Menth.* soluta, nec removendus catulus ante pilularum usum.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus, & duplicatis pannis laneis ventrem à frigore defendat.

*De Febre Pestilentiali 1665, 66.*

Post venæsectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia Lanæ

incipiti alligetur ; tum, si vomitus non adsit, hoc vel simile Hydroticum exhibe.

℞ *Theriac. Andromach.* ʒss. *Elect. de ov.* ʒj. *Pulv. è chel. cancr. comp.* gr. xii. *Coccinel.* gr. viij. *Croc.* gr. iv. cum s. q. *succ. kermes, f. Br-lus*, quem sumat sextâ quâque horâ, superbibendo *Cochl.* ʒj. seq. *Julapii*.

℞ *Aq. Card. Benedict.* ℥. *Scord. compos.* an. ʒiv. *Aq. Theriacal. stillatit.* ʒij. *Syr. caryophil.* ʒi. *M. F. Julapium*.

Si adsit vomitio, hydroticum differatur, donec solo tegumentorum pondere sudor promanare incipiat, linteaminis parte vultui superinductâ.

Incepta Diaphoresis haustulis *Zythogalæ salviâ alteratæ*, vel *Cerevisiæ* cui macis aliquantulum incoxeris subinde repetitis ad naturalis diei spatium ( i. e. horas 24. ) est continuanda ; in sudore licet jusculis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sustinui ; per horas adhuc à finito sudore xxiv. ægro se in lecto continente frigus cautè devitetur. Indusium sponte suâ in corpore arefcere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & *Zythogalæ salviâ alteratæ* usus etiamnum continuetur, in seq. luce potio purgat. communis exhibeatur.

Anni



Anni 1667, 1668. Febrim Variolosam & Variolas præduxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72. Febrim Dysentericam. \

Anni 1673, 74, 75. Febrim Comatosam.

Curationem febrium horum annorum non attingo; quoniam methodo in febre anni 1685, &c. descriptâ curari eas potuisse autumno.

*p. 19.*

*De Febris Intermittentibus.*

Cum rigore & horrore adoritur paroxysmus, quibus mox succedit calor, & huic tandem sudor, & subsequens *ἀμπεξία*: licet in primis morbi diebus, Autumno maximè, aliquoties remissio potius quàm intermissio perlentiscitur, in calore æque ac in rigore vomiturit ut plurimum ac vehementer ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultis crurum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, rauco, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciant.

*℞ Cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥i. cum s. q. Syr. Caryophyll. vel de Rosis siccis, f. Electuarium dividendum in xii. doses; quarum unam capit quartâ quâque horâ, superbibendo Vini cujuscunque haustum, incipiend. immediate post paroxysmum.*

*Si*

Si autem præscripti boli ventrem move-  
rint, in haustu Vini dentur gutt. x. *Laudan.*  
*liquid.* singulis vel alternis vicibus post as-  
sumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipuè  
in quartana) repetatur processus prædictus  
singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat.

℞ *Cort. Peruv. pulv. ℥i. cum s. q. Syrup.*  
*caryophyll. f. Pilulæ mediocris magnitudinis.*  
quarum capiat vi. quartâ quâque horâ.

℞ *Cort. Peruv. pulv. ℥ii. Vin. Rhenan. ℥ii.*  
*stent simul in Infusione frigida, & coletur per*  
*manicam Hippocratis. Usus tempore cap. ℥iii.*  
*tertiâ vel quartâ quâq; horâ.*

Sin ob vomituritionem, ferè continuam,  
Corticem deglutire nequeat æger, tum sexies,  
vel octies, Spatio duarum horarum, *Succi*  
*Limonum* recens expressi *Cochl. j. cum Salis*  
*Alsinib. ℥j.* assumat, dein *Laudan. Liquid.*  
*gutt. xvi. cum Aq. cinnam. fortior. Cochl. j.*  
ac brevi post, cessante vomitu, *Corticis* usum  
aggrediatur.

In intermittentibus vernalibus, nonnun-  
quam emeticum, tempestivè propinatum, ut  
nempè ante paroxysmum negotio suo defun-  
gi possit, foelicissimè successit, Nonnunquam  
Enema in diebus intermittentibus, per tri-  
dium, vel quatrimum injectum, Curatio-  
nem

nem absolvit. Quæ sequenti quoq; modo tentari potest.

℞ *Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverisat. gr. xv. Vin. alb. ℥iii.* Sumat duabus horis ante Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per *iii. vel iv. horas*, idem faciendo per duas alias vices ante Paroxysmum.

Si ab ingeminatis paroxysmis summe debilis fuerit æger ;

℞ *Conserv. Flor. Borag. Bugloss. an. ℥i. conserv. Anthos. ℥ss. cort. citr. condit. Nuc. Moschat. condit. Theriac. Andromach. an. ℥iii confectio. Alchermes. ℥ii. M. F. Opiata cap. ad quantitatem avellanæ, manè & vesperi, superbibendo Cochlearia paucula, alicujus Aq. Epidemicæ simplicioris, Saccharo edulcoratæ, interdicto interim enematum usu.*

Si sub morbi exitum occurrat hydrops, nondum tamen depulsâ Febre curatio non est instituenda remediis purgantibus, sed infusionibus rad *Raphan. Rustican. Summitat. Absinth. centaur. Min. Baccar. Juniper. cinerum genist. &c.* in vino factis, exulante autem Febre, Catharticis, & aperientibus.

Pro Infantibus Febre intermittente laborantibus.

℞ *Aq. cerasor. nigr. & Vini Rhenan. an. ℥ii cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥iii. Syr. caryophyll.*



*phyl. 7i. M. F. Fulap. Cap. Cochl. j. alterumvè, pro ratione ætatis quantâ quâq; horâ, donec Paroxysmi non amplius discrucient, insillando alternis vicibus, si Diarrhœa adfuerit; Laud. liquid. gutt. i. vel ii.*

*De Febre Stationaria, ab an. 1685, ad 90.*

Calor & frigus se invicem excipiunt, artus pariter & Caput dolent, pulsus interim ferè sanus, nonnunquam tussis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio Febris prope noctem, inquietudo, sitis, lingua vel humida & ex omni parte pelliculâ albâ & scabrâ vestita, vel Sicca, fusci coloris in medio, quam partem undiq; cingit fimbria inallescens. A jugi in lecto decubitu coma & phrenesis, à Calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulsus inordinatus, tendinum subsultus, atque ita tandem mors. Sudores in initio symptomatici divexant, qui si ab arte provocentur, viscosi à Capite erumpunt, & materiam morbificam in Caput aut in artus transferunt.

Mittat. Sanguis ad 3x. è brachio. Reiteretur Venæsectio; si modò respirationis difficultas, dolor Capitis inter tussendum lancinans, & alia signa Peripneumoniæ nothæ adsint. In hoc casu tam venæsectio quàm Catharsis repetenda, donec æger convalescit.

Ve-

Vesperis applicetur Epispasticum & sequenti Aurorâ Potio Lenitiva præscribatur, quæ ad tertiam vicem alternis diebus reperatur, & horâ somni post Catharsin haustus pacificus propinatur.

℞ *Aq. Paralys.* ℥iii. *Syr. de Mecon.* ℥i. *Succ. Limon. recent. Extract. cochl.* ii. *M. F. Haustus.*

Aphthæ & singultus sponte sua post curationem febris supervenientes sponte evanescent; Si in longum tempus decurrant, faciliè sugantur *Cortic. Peruv.* ℥i. cum *Syr. Papav. Rhæad. q. s. in formam Electuar. vel pilular. redactâ,* superbibend. haustum lactis deflorati. Remedium hoc certissimè scopum attinget, si non frustrentur ejus vires ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis sequentia præscribantur.

℞ *Conserv. Lujul. & cynosbat, an.* ℥i. *conserv. Berber. & ss. crem. Tart.* ℥i. cum *s. q. Syr. de Limonib. f. Electuarium,* de quo cap. ad magnitud. *Nuc. Moschat. ter in die,* superbibendo sequent. *Julap. Cochl.* vj.

℞ *Aq. Portulac. Lactuc. Paralys. an.* ℥iij. *Syr. de Limonib.* ℥iij. *Syr. Violar.* ℥j, *M. f. Julapium. Vel.*

℞ *Aq. font.* ℥j, *aq. Rosar.* Succ. *Lin.*<sup>4j</sup>  
*num Sacchar. albiss.* an. ℥iv, coq. lento igne  
 dum despumaverint, cap. ℥iij. ad libitum.  
 præscribatur quoque seq. gargarisma.

℞ *Succ. Pomor agrest.* ℥ss. *Syr. de rubo* I-  
 deo ℥j. m. f. gargarisma.

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger  
 potionem retinere nequeat, *Pil. Coch. maj.*  
*ad* ℥ij, exhibeantur, tum etiam hypnoticum  
 est concedendum, v, gr. *Laudan. Londin.* gr.  
 iß, cum simili quantitate *Mastich.* vel *Laudan.*  
*Liquid.* gut. xvij, in *aq. Cinnamom.* hor-  
 deat. ℥j.

*Decoctum album paratum*, ex ℥j, C. C.  
*usti*, in *aq. communis* ℥iij. cocti & postea *Sac-*  
*charo albissimo* edulcoratum. sit pro potu, ut  
 & *Cerevisia tenuis* pro libitu.

Post Catharsin bis celebratam, concedatur  
 ægro, Pullorum carnibus vesci, & post ul-  
 timam Purgationem modo febris aliquan-  
 tulum deslagraverit, vini Canarini cochl.  
 iij, vel iv, mande, & sero, ut & post Prandi-  
 um, per dies aliquot propinentur.

In Phrenitide, ut & Comate, nihil per-  
 inde confert, atq; ægri caput radi, nullo  
 admoto Emplastro, sed Pileolo tantum.



V

ti <sup>A</sup> <sup>Si</sup> (quod fœminis hystericis quandoq; accidit) post venæsectionem, & purgationes, huiusmodi iteratas, etiamnum duret, procurretque febris, modo signa Peripneumoniæ, & inflammationis circa partes vitales absint, Singulis noctibus Paregoricum, & medicamenta hystERICA, bis vel ter in die, injungantur.

*De Infantibus febre Stationariâ laborantibus.*

*Hirudines* duæ utrinq; ponè aures applicentur, dein *Emplastr. Epispasticum* cervici admoveatur.

*Cerevisiâ*, quâ *Rhabarbarum* fuerit infusum, purgetur.

Si post Catharsin febris intermittere videatur, tum *Fulapium cum Cortice Peruviano* (in Capite de febre intermittenti pro infantibus descriptum) exhibeatur.

*De febre Scarlatina.*

Æstate exeunte, infantes præcipuè infestat. Rigent & horrent sub initium; nec tamen admodum agrotant; cutis universa maculis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus & magis rubentibus quàm in morbillis, interflingitur: Ad duos tresve dies persistunt, quo quidem tempore evanescunt, & decedente subjactâ cuticulâ squammulis suffuraceis, ad instar farinæ, cutis conspargitur.

R

℞ C. C. usti & pulv. è Chel. cancr. compo  
an ʒʒ. Coccinel. gr. ij, Sacchar. Crystall. ʒj, M. f.  
pulv. subtiliss. in xij, Chartulas dividend qua-  
rum unam Cap. 6 quâque horâ, superbi-  
bendo cochl. ij, vel iij, sequentis Julapii.

℞ Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis alexeter. an.  
ʒiij, Syr. e succ. citri ʒj, M. f. Julap.

Applicetur etiam Epispasticum cervici, &  
qualibet nocte paregoricum ex Syr. de Mecon.  
propinetur, & postquam symptomata cessa-  
verint, purgetur æger.

#### *De pleuritide.*

Inter Ver & Æstatem dominatur. Arigore  
& horrore orditur, quos statim comitantur  
calor, sitis, inquietudo & cætera febrium  
symptomata; elapsis pauculis horis, æger ve-  
hementi dolore punctorio in laterum alter-  
utro circa costas corripitur, qui nunc versûs  
omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pe-  
ctoris sese propagat, tussî crebrâ excruciat,ur,  
Materia sputo rejecta in initio morbi pauca est  
& tenuis, & sæpe sanguinis particulis inter-  
mixta, progressu verò copiosior & magis con-  
cocta, sanguine etiam permixta. Febris pa-  
ri passu incedit cum tussî, sputo sanguinis,  
dolore, & pro ratione liberioris expectora-  
tionis lentim imminuitur; nunc alvus est  
astricta, nunc soluta nimis. Eductus è ve-  
na sanguis sevi liquati speciem præ se fert ubi  
refruxerit.

Mitta-

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti  
ti 3x.

℞ Aq. Papav. R℞ ad. 3iv, Sal. Prunel. 5j,  
Syr. Violar. 3j. M. f. Haustus, sumendus sta-  
tim à prima venæ sectione.

℞ Amygd. dulc. excorticat. N° v, sem Me-  
lon. Pepon. an. 3ß. sem papav. alb. 3iij, aq.  
bord. 3iiss, aq. Rosar. 3ij, cum s. q. sacchar.  
cand. f. s. a. Emulsio, Cap. 3iv, 4<sup>a</sup> quâque  
horâ.

℞ Decoct. Pectoral. 3ij, Syr. Violar. 3  
Cap. Ven. an. 3iiss, M. f. Apozema. Cap. 3ß,  
ter in die.

℞ Ol. Amygd. dulc. 3ij, Syr. Violar. 3  
Cap. Ven. an. 3j, Sacchar. Cand. q. s. M. f.  
Eclegma, de quo sæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc, per se, vel Oleum sem-  
Lini recenter extract: exhiberi potest.

℞ Ol. Amygd. dulc. Lilior. 3 unguent. Di-  
althææ, an. 3j, M. f. Linimentum, quo inun-  
gatur latus affectum manè & serò superim-  
ponendo fol. Brassicæ.

Reperatur Venæsectio ad tres alias vices,  
ad eandem quantitatem, quatuor diebus  
continuis, ubi dolor & respirandi difficultas  
suadent. in illis locis ubi venæ sunt  
superficiales per omnia tempora De  
recursum.



*De peripneumonia notha.*

Ingruente hyeme & sæpe sub ejus exitum emergit, insultu primo nunc incalescit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculiq; tussit, & inter tussendum dolor capitis lancinans premit, potulenta vomitu rejicit, urina turbida est & intensè rubet, sanguis pleuritico-  
rum æmulus, anhelus crebrò & celeriter spiritum ducit, dolente thorace. Ab asthma-  
te sicco planè distinguitur, quòd in isto nusquam comparent febris indicia, in hac manifestò se produnt, licèt minora longè & magis obscura quàm in peripneumonia vera.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒx. Die sequenti æger hanc potionem sumat.

Rx *Cassia extract.* ʒj. *Glycy.* ʒij. *ficus pingues* N<sup>o</sup> iv. *fol. senn.* ʒiij. *Agaric trochiscat.* ʒj. *coq. s. q. aquæ ad ʒiv. in Colatur. dissolv.*  
*Mannæ* ʒj. *Syr. Rosar. solut.* ʒss.

Si verò potionem assumere nequeat, *Cap. Pil. coch. maj.* ʒij. horâ quartâ matutinâ.

Sequenti die celebretur iterum venæsectio, ad eandem quantitatem; ac postero die repetatur Catharsis, quæ porrò repetenda est alternis diebus, vel post majora intervalla, pro ratione virium; Atq; insuper si Symptomata non cessaverint, extrahatur iterum sanguis semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot

C

inter-

interjectis, prout res postulaverit; sed ut plurimum venæsectio bis celebrata sufficiet, Interim, dum hæc fiunt, præsertim in diebus à purgatione vacuis, utatur *decocto Pectorali, Eclegmate & oleo Amygd. dulcium*, in Pleuritide descriptis.

*De Rheumatismo.*

Rigorem & horrorem & cætera febrium symptomata patiuntur, elapso die uno alterove (est & ubi citius) dolor adest atrox nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris & genibus præsertim, vicissim hos relinquens & illos occupans, rubore & tumore in parte, quam postremum affecit, adhuc residuis. Febris sensim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immaniùs sæviante. In lumbagine rheumatica immanis dolor adest, circa lumborum regionem fixus, nephritin mentiens, nisi quòd æger non vomituriat, qui procumbere nequit, sed vel è lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetuâ agitatione nunc versùs anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur Sanguis è brachio lateris affecti, ad 3x.

℞ *Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. an. ʒiv Syr. de Limonib. ʒiſs. Syr. Violac. ʒj. M. f Julap. de quo bibat ad libitum.*

Præ

Præscribend. *Emulsio* 4. *Sem. frigid. maj.*  
*Cataplasma* è *mica panis albiss.* & *lacte Croco*  
*tincto* applicetur parti dolenti.

Die sequenti eadem sanguinis quantitas de-  
 trahatur; atq; iterum, die uno vel altero in-  
 terjecto, reiteretur. atq; porro quater vel plu-  
 ries, si opus fuerit, hoc observando, ut post  
 secundam Venæsectionem majora sint inter-  
 valla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis Enema de  
 lacte saccharato subinde injiciatur, vel se-  
 quens;

℞ *Decoct. commun. pro Clystere* ℥ij. *Syr.*  
*Violar.* & *Sacchar. culinar. an.* ℥ij. *M. f. E-*  
*nema.*

Si Imbecillitas ægri repetitionem Phlebo-  
 tomix non ferat, tum post secundam vel ter-  
 tiam venæsectionem Curatio hac methodo  
 tentanda.

Capiat alternis diebus *portionem purgati-*  
*vam communem*, donec convaluerit, & iisdem  
 nostris Paregoric. ex *Syr. de Mecon.*

Sin his remediis non cedat, & æger ob im-  
 becillitatem evacuationes qualescunq; ferre  
 nequeat, aggrediatur usum *Elect.* & *aq. An-*  
*tiscorbutic.* in scorbuto descript. quæ etiam  
 remedia locum habent in Rheumatismo  
 Scorbutico.

In Juvenibus, atq; iis qui temperatè vive-  
 runt, vino non plus æquo dediti, Rheuma-



rilinus. Dixitâ simplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æq; feliciter, ac repetitis Venæsectionibus (quas minus ferre queant) profigari potest. Ex. grat.

Solo Lactis sero ad dies quatuor vescatur æger, postea præter serum pane similagineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat; nisi quod postremis diebus iterum panem in coenam indulgere liceat. Symptomatis cessantibus, carnes pullorum elixorum, ceteraq; eupepta concedantur, tertio autem quoq; die solo lactis sero victitet, donec tandem pancreaticè valeat.

#### *De febre erysipelatoſa.*

Nulla non corporis pars, præsertim facies, tumet, dolet & summè rubet, pustulæ densæ, parvæ, in vesiculas subinde faceſſunt, quæ per frontem caputq; serpunt, oculi tumore obruti, rigor & horror atq; reliqua febris indicia adsunt. In alia hujus morbi specie, liquorum attenuantium potationi superveniente, febricula adest, pustulæ urticarum puncturas referentes, nonnunquam in vesiculas sublatae, mox recedentes, tuberculorum more sub cute se condentes, maximè pruriunt, & scaldendo rursus apparent. Est & alia eruptionis species, pectus ut plurimum obſidens, macula nimirum lata, cuti vix supereminens, porriginosa, cum squammulis flavis, qua

qua vigente, æger bene se habet, eâdem evanescente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iisdem remediis, quibus pruritus terinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis è brachio ad  $\text{zix}$ . vel  $x$ . Die sequenti sumat *portionem communem purgativam*.

$\mathcal{R}$  Rad. Althææ & Lilior. an.  $\text{zj}$ . sol. Malv. Sambuc. Verbasco. flor. Chamamel. Melilot. summat. Hyperic. & centaur. minor. an.  $M. j.$  sem. Lini, fœnugræc. an.  $\text{zß}$ . coq.  $\text{f. q. aq. ad } \text{ttij}$ . Coletur liquor, & tempore usûs adde singulis libris decocti Sp. Vini  $\text{zij}$ . Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac expressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post forum sequenti mixturâ illinatur.

$\mathcal{R}$  Sp. Vini  $\text{ttß}$ . Theriac. Androm.  $\text{zij}$ . pulv. piperis longi, & Caryophyll. an.  $\text{zij}$ . f. mixtura. q. à Charta Emporetica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ venæsectioni non cedat morbus, rum repetatur; & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæsectione liberis *Enema è lacte cum Syr. Violarum. Emulsio Refrigerans & Zulap. refrigerans*, sunt præscribenda.

De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharfi non cedunt.

℞ Theriac. Andromach. ʒss. Elect. de ovo  
vj. rad. Serpentar. Virgin. subtiliss. pulver. gr.  
xx. Lapid. Bezoar. oriental. gr. v. cum f. q.  
Syr. & conditur. citri. f. Bolus, horâ somni  
sumendus per dies xxj. sepebibendo cochl.  
vj. sequent. Julapii.

℞ Aq. Card. Benedict. ʒvj. aq. Epidem. &  
Theriacal. Stillat. an. ʒij. Syrup. Caryophyll. ʒj.  
M. f. Julap.

Singulis matutinis cap. liquoris possetici  
n. calidè, & sudet horæ unius spatio.

His finitis, si pustulæ adhuc non evanue-  
rint, sequenti Linimento partes affectæ inun-  
gantur.

℞ Unguent. ex Oxylapatho ʒij. Unguent.  
Pomati ʒj. flor. Sulphur. ʒiij. ol. Rhodii ʒss.  
f. Linimentum.

Veruntamen Medicamenta præscripta  
haud usurpentur, nisi Venæsectione & Ca-  
tharfi ritè præmissis.

#### De Angina.

Angina inter Ver & Ætatem ut plurimum  
aggredditur. Sequuntur febris insultum do-  
lor & faucium inflammatio, unde à tumore  
uvulæ



uvulæ, tonsillarum & laryngis, nec deglutire queat Æger, nec spiritum ducere.

Mittatur Sanguis d Brachio copiosè. Tangantur partes inflammatae melle Rosaceo, Sp. Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem permixto, vel Sp. Vitrioli solo. Mox Gargarisma sequens usurpetur, non vulgari modo; sed ita ut sine ulla agitatione in ore continetur, donec incalescat; dein expuatur, & repetatur subindè.

*R. Aq. Plantag. Ros. Rubr. & Sperm. Ranar. an. ziv. album. ovor. in aquam agitando redact. N° iij. Sacchar. Crystal. ziiij. M. f. Gargarisma.*

*Emulsio Refrigerans* in Pleuritide descripta indies sumatur.

Sequenti manè, nisi febris & dolor inter deglutendum remiserint, Venæsectio repetatur, Catharsi in diem posterum rejectâ, aliàs Catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quod oppidò rarum) repetatur adhuc Venæsectio, & Catharsis; Epispasticum amplum ac forte applicetur cervici post primam Venæsectionem. Omni manè, nisi diebus purgationi datis Ene-  
ma refrigerans & Emolliens injiciatur; Diætâ tenui utatur æger, & lecto per horas aliquot quotidie abstat.

In his omnibus Febris, quas intercurrentes appello, ut etiam in illa, quæ statica est, cautè observandum, quòd æger à lecto abstinere magnam diei partem, ut iussulis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victitet, & cerevisiam tenuem Lupulata & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

### *De Morbillis.*

Infantes plerumq; impetunt. Primo die rigent horréntque, calent & frigent alternatim. Secundo consummatam febrem accersunt. Ægritudo vehemens, sitis, inappetentia, lingua alba (non verò sicca) tussicula, capitis & oculorum gravedo, & somnolentia perpetua, acriter premunt, humor è naribus & oculis jugiter stillat (quæ lachrymæ certissimum morbillorum signum.) Huc accedunt stertutatio, tumor palpebrarum pauló ante eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum dejectionibus colore viridi in dentientibus præsertim. Symptomata ingravescent ad quartum usq; diem, quo quidem die (nonnunquam quinto) in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicum morsibus persimiles prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è parvulis papulis, supra cutim paululum elevatis conflantur, quarum protuberantia

rantia digito levi, vix oculorum acie, deprehendi possit.

A facie, quam primò solum occupans, ad pectus ventremque, crura deinde tibialque propagantur maculae; in his autem partibus latae & rubrae, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus; sed tussicula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & innappetentia perseverant. Die sexto aut circiter frons & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptaq; cuticulâ, in reliquo corpore maculae latissimae sunt, & maximè rubescunt, Octavo circiter die in facie evanescent, & vix in reliquo corpore permanent. Nono nullae prorsus sunt; per faciem verò & artus quandoq; & totum corpus in farinam quandam & squammulas facessunt. & tunc temporis febris, spirandi difficultas & tussicula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

℞ Decoct. Pectoral. ℞ij. Syrup. Violar. ℞  
Cap. Ven. an. ℞ij. M. f. Apozema; Cap. ℞ij.  
vel iv. ter vel quater in die.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℞ij. Syr. Violar. ℞  
Cap. ven. an. ℞j. Sacchar. Cand. albiss. q. s.  
C 5 M



*M. f. Eclegma*, de quo sæpius lambat, præcipuè quando tussis urget.

*Rx Aq. Cerasor. nigr. ℥iij. Syr de Mecon. ℥j. M. f. haustus* singulis noctibus sumendus, à primo morbi insultu, usq; dum convalescerit æger, dosin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris, respirandi difficultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus è brachio, semel, bis, vel ter, prout opus fuerit, convenienti spatio interposito inter singulas Venæsectiones; Atq; etiam continuentur decoctum Pectorale supra descriptum, ut & *Loboch*, vel *Ol. Amygd. dulc. per se*. Circa diem *xij.* ab invasione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhœa, quæ morbillos excipit, Venæsectione sanatur.

#### *De Variolis.*

Distinctæ sunt vel confluentes, & in distinctis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomitatio, inadultis ingens in sudores propensio (& hinc minimè confluxuras esse licet conjicere) dolor sub scrobiculo cordis si manu

manu prematur, stupor & somnolentia, nonnunquam & insultus epileptici (in infantibus præsertim) quibus si, dentitione peractâ corripiantur, in procinctu esse variolas possis prædicere, ita ut si fortè insultum epilepticum sub vesperam patiantur, sequenti Aurorâ in conspectum se daturæ sunt variolæ, mites ut plurimum & rarissimè confluentes. Quarto inclusivè ab invatione die nonnunquam seriùs, rarò tamen ante illum erumpunt, quo tempore vel minuuntur Symptomata vel prorsus evanescunt. In eruptione autem subrubræ primò pustulæ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes, sparsim se produnt per faciem, collum, pectus, & corpus universum; tunc in faucibus dolor, qui cum pustulis surgentibus augetur. Circiter octavum à primo insultu diem intervalla pustularum priùs alba rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos claudunt. Proximæ à facie intumescunt manus, digitiq; distenduntur; pustulæ faciei antea læves & rubræ, jam asperæ (primum maturationis indicium) & subalbidæ apparent, succum insuper luteum, colore à favo non abludentem evomunt, faciei & manuum inflammatio jam summa in pustularum interstitiis colorem exhibet floridum, & rosarum Damascenarum æmulum, quem quidem colorem, quo minores sunt variolæ, eo magis tum

pustulæ tum cutis interjecta ad amissim exprimunt : Quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione ; quæ manus & reliquum corpus minus asperæ albæq; magis conspiciuntur indies. Die undecimo faciei tumor & inflammatio recedunt, pustulæ maturæ & justam magnitudinem (viz. pisi grandiusculi) adeptæ exarescunt deciduntque. Decimo quarto vel quinto pereunt funditus ; manuum autem pustulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt & tandem dirumpuntur, cæteræ autem, faciei nimirum & corporis desquamantur, & in facie squammulis hisce fursuraceis succedunt foveæ. Per totum morbi decursum alvus vel prorsus constipatur vel rarissimè dejectit. Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in discretis, undecimo autem in confluentibus intereunt : Quippe cum in discreto hoc genere promoven-  
 ventur sudores tum cardiacis tum regimine calidiore, prædicto die facies, quæ turgida & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat, è contra flaccida reperitur & albescens, pustulis nihilo minus rubentibus & elevatis, etiam post ægri mortem ; sudor, qui huc usq; manaverat, derepentè evanescit, æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine, vehementibus, urinam parcè reddit ac frequen-  
 ter,



ter, & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomituritio, &c. immanius sæviunt; licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit. Tertio die aut citius, rarò tardius, erumpunt; & quo citius, eo magis confluunt. Quandoq; ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod symptoma, v. g. acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non perinde, ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem pustularum ægrum discruciant: Nunc erysipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt, eruptionis licet tempore planè distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem implicita, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturius elevant quàm discretæ: postmodum ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatae cutis superficiem non admodum superant. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim  
magis

magis exasperatur, colore fusco: Intensus magis est dolor cutis, donec tandem in truculentiori morbo non nisi post diem vicesimum latioribus laminis desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quod quanto pustulæ maturescentes proprius ad colorem subfuscum vergunt, eò deteriores lentius abscedunt; quomagus autem flavescent, eò minus confluxerint, & ocyùs se proripiunt. Ubi primum deciderit pellicula, nullâ scabritie vultus afficitur; at verò mox illam excipiunt squamulæ furfuraceæ, indolis perquam corrosivæ, quæ foveas relinquunt: patentiores, & sæpe cicatrices. Quandoq; humeri & dorsum cuticulâ denudantur. Morbi periculum à pustularum frequentia & numero in facie solâ, æstimandum. Pustulæ manuum & pedum majores, & quo altius ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultis salivatio in infantibus diarrhœa (licet non ita certò) confluentium comes. Ptyalismus nunc cum eruptione se prodit, nunc biduo triduo præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viscidiorē ægerrimè, excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit, & potus per nares revertitur. Tunc cessat ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti debeat

beat, non tamen nisi post diem unum alcerumve omnino recedere) & manuum jam insigniter incipiens & diutius perdurans suppetias rulerint, ægro protinus moriendum est. Diarrhœa non ita maturè infantes occupat ac pyralismus adultos. In utraq; variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, quâ peractâ, desinit. Superveniunt à malo regimine symptomata anomala; qualia sunt, pustularum flacciditas & subsidentia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigrae exiguae in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur: Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne perficitur.

Dies in quo maximè periclitatur æger, in confluentibus in minimè crudo, & maximè vulgari genere, à primo morbi insultu, est undecimus, in crudiore adhuc decimus quartus, & in crudissimo decimus septimus; nonnunquam tamen sed rarius, non ante diem vicesimum primum moritur æger. Quinimo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum Septimum interjacet, appetente vespérâ, molestissimo inquietudinis



etudinis paroxysmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasione ad  $\mathfrak{zix}$ . vel  $x$ , & postea *Vomitorium* exhibeatur ad  $\mathfrak{zj}$ . vel  $\mathfrak{ziss}$ . *Infusionis Croci Metallorum*

His primis diebus diluatur sanguis frequenti potatione Cerevisiæ tenuis Lupulatae. Cui Vitrioli Spiritus immisceatur usque ad plenam pustularum eruptionem.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum est sexto die post invasionem) vesperi propinetur *Syr. de Mecon.*  $\mathfrak{zj}$ . quæ repetatur dehinc singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Eâ nocte, si Variolæ è Confluentium genere fuerint, augeatur dosi ad  $\mathfrak{ziss}$ . quæ dein repetatur ad  $\mathfrak{zj}$ . manè, & ad  $\mathfrak{ziss}$ . serò, singulis noctibus, donec æger convalescit.

Si *Syr. de Mecon.* minus congruat, substitui possit *Laudan. Liquid.* viz. gutt.  $xviij$ . pro  $\mathfrak{zj}$ . *Syrupi* & gutt.  $xxv$ . pro  $\mathfrak{ziss}$ . Hoc interim observandum, quod si paregoricum bis in die exhibitum orgasmum compescere non valeat (quod in Variolis insigniter confluentibus sub finem earum sæpe accidit) tum 8<sup>a</sup> quaq; horâ exhibendum, vel sæpius, si opus fuerit.

At si variolæ Interstinctæ fuerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus post plenam eruptionem exhibeatur Paregoricum, atq; etiam in minori dosi.

Qua-

Qualiscunq; autem generis variolæ fuerint, atq; etiam qualicunq; morbi tempore, si Phrenitis acciderit, omnino oportet ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur, ac proinde si prior Paregorici dosi metam non attingat, alia atq; alia assumatur, donec tumultus penitus compescatur, interpositio inter singulas doses spatio aliquo ; ut per noscere valeamus, utrùm dosi ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger è lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeò viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum Syringa sæpe in fauces injiciatur. Componatur è *Cerevisia tenui vel aq. bord. cum Melle Rosarum*; vel sequens usurpari poterit.

*Rx Cort. Ulmi ʒvj. rad. Glycyrrhiz. ʒss. Passul. enucleat. N° xx. ros. rub. p. ij, coq. f. q. aq. ad ʒiij. in Colatur. dissolv. oxymel. simp. & mell. Rosar. an ʒij. M. f. Gargarisma.*

Si epispastico opus fuerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte istâ, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto paregorico, plantis quoq; pedum applicari potest allium, à die octavo, usque ad morbi finem, singulis diebus renovandum.

Si

Si Infans de Symptomatis, dentitionem comitantibus, jam securus, derepente spasmo corripitur hic cogitandum est, convulsionem istam, fortassis à naturæ conatu, quæ variolas, scarlatinam Febrem, aut morbillos, in corporis habitum protrudere satagit, pendere; applicetur itaq; Emplast. Epispasticum nuchæ, lecto quamprimum committatur æger, exhibeatur insuper cardiacum, cui Paregorici paucillum est admiscendum, puero nempe trienni *Laud. Liquid. gut. v. in aq. Epidem. cochl. j.*

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, febris secundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus symptomatis, usq; adeò efferatur, ut Paregoricis utcunq; repetitis sufflaminari nequeat, & mors quasi immineat, tum sanguis ad satis magnam quantitatem illicò detrahatur, nempe ad  $\text{xxij}$ . vel circiter, atq; porrò repeti possit semel vel bis in sequentib. diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postulârit; at non aliàs. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eunt insequente (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitivi ℥j. dissolut. in aq. Cichor. vel. lactis Alexeter ℥iv.* Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minùs Paregorica in usum veniant, quæ, (haud obstantibus iis tam quoad largam dosin quàm repetitam exhibentur)



exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, inungatur facies Linimento ex æqualib. partib. *ol. Amygd. dulc. & Pomat.* per biduum; at non ultra.

Die *xxj.* post invasionem mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porrò alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usq; ad *xvij.* non aliis stragulis tectus, quàm quibus sanus uti solebat.

Jusculis Avenac. hordeac. Pomis coct. & Cerevisiâ tenui victitet, & post undecimum diem vini Hispanic. *Cochl. iv.* vel. *v.* bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor non evacuationibus præscript. cedat, tum fectu fol *Malv. verbasc. Sambuc. Lauri,* cum floribus *Camæmel. & Melilot.* in lacte coct. faciliè fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat sanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præscribuntur, sextâ quâq; horâ (donec symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

*De*

*De chorea Sancti Viti.*

Convulsionis species quædam est, pueros puellâsve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os posset adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim rectâ lineâ ori admovent, sed deductâ à spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem fortè fortunâ labris propius apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit; deditâ tanquam operâ, ut spectantibus risum moveret.

Sanguis ad  $\text{ʒviij}$ . plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, potionis commun. hauriatur; & vesperi haustulus sequens propinetur.

*R̄ Aq. Cerasor. nigr. ʒj. aq. Epilept. Langii ʒiij. Theriac. Andromach. ʒj. Laudan. Liquid. gut. viij. f. haustus.*

*Potio*

*Portio Cathartica* ad tres vices, alternis diebus, repetatur; & *haustus Paregoricus* iisdem noctibus.

Postea Sanguis iterum extrahatur; & ad Catharsin, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem; spatio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis sequentia præscribantur.

℞ *Conserv. Absinth. Roman. & flaved. Aurantior. an. ʒj. Conserv. Anthos ʒß. Theriac. Andromach. vet. & nuc. moschat. condit. an. ʒiij. Zinzib. condit. ʒj. Syr. è succ. citr. q. s. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibend. vini sequentis Cochlear. v.*

℞ *Rad. Pæoniæ, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. an. ʒj. fol. Rut. Salv. Betonic. Chamædr. Marrub. alb. & summitat. Centaur. min. an. Mj. Baccar. Juniper. ʒvj. Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in vini Canarini ℥vj. Coletur tantummodo usûs tempore.*

℞ *Aq. Rut. ʒiv. aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. an. ʒj. Syr. Pæon. ʒvj. M. f. Zulap. cap.*



cap. Cochl. iv. singulis noctibus cubitum iturus, instillando *Sp. C. C. gut. viij.*

Applicetur plantis pedum Emplast. à *Caranna.*

Ob Recidivæ motum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni sequentis tempestate (vel paulo ante) quâ morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quòd hæc methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit, quod tamen non adhuc expertus sum. Cum verò Chorea *Viti* ætates teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quàm Catharticorum dosis adaugeantur.

#### *De Apoplexia.*

Somnus est profundissimus, & omnimoda sensûs & morûs privatio, exceptâ respiracione, quam ægri habent difficilem cum stercore.

Mittatur Sanguis è brachio ad  $\text{xxij}$ . quantum primum, ac postea ex venis jugularibus ad  $\text{xxij}$ . deinde *Vomitariûm ex ziss vel zij. Infus. Croc. Metal.* propinetur statim.

Emplast. *Epispastic.* satis amplum ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecto, nec stragulis nimis obrutus.

*Sp. Sal. Armoniac. optim.* rectificatus admoveatur naribus.

Finit

Finitâ Vomitorii Operatione, subinde exhibeantur Cochl, iij. vel iv. sequentis Julapii.

℞ *Aq. Rutæ* ℥iv. *aq. Bryon compos.* ℥  
*Antiepilept. Lang an.* ℥j. *Sp. C. C. gut.* xx.  
*Sacchar. Crystal. q. s. f. Julap.*

Vel *Cochleare* j. *Sp. Lavendulæ compos.* per se propinari possit bis vel ter, durante paroxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpositâ.

Cavendum est, ne Cardiacâ plus justo calida, ac nimis frequenter (utî mos est) exhibeantur; nam quæcumq; demum specificâ virtute pollere videantur, plus damni quàm emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata sunt: quod etiam incommodum non minùs infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur.

℞ *Pil. Coch. maj.* ℥ij. cap. tertiâ quâq; die per 6 vices horâ 4<sup>a</sup> matutinâ, superdormiendo.

℞ *Conserv. flor. salv. Rosæ marin. an.* ℥j.  
*Conserv. flaved. Aurant.* 3vj. *nuc muschar. condit.* ℥  
*Zinzib. condit. an.* 3℔. *Theriac. Androm. vct.* 3ij. *pulv. elect. diamb. diamosch. dulc.* an. 3j *cims. q. Syr. conditur. citr. f.*  
*opiatâ*

*opiata*, capiat ad magnitudinem *Castanæ* manè & serò, superbibend. *aq. Epilept. Lang. Coch. ij.*

℞ *Ambr. gris. ʒʒ. ol. destil. sem. Anisi, cinnamom nuc. moschat. an. gut. ij. ol. Caryo- phyl. gut. j. Sacchar. in aq. flor aurantior. solut. ʒiv. f. s. a Tabellæ*, quarum capiat unam ad libitum.

Ab usû potus generosioris cujusvis sibi temperet, vescatur jusculis avenaceis, hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quandoq; etiam (præcipuè inter purgandum) carne pullorum agnorum ac id genus ciborum eupepton.

#### *De Optthalmia.*

Ex oculorum inflammatione patet.

Mittatur Sanguis è brachio ad ʒx. Sequenti die sumat potionem purgativam communem, quæ repetenda est per duas alias vi- ces, duobus diebus interpositis; iisdem noctibus sumat *haustum paregoricum ex Syr. de Mecon. ʒj.*

Diebus à purgatione vacuis sumat ter aut quater in die ʒiv. *Emulsionis ex sem. frigid. maj. & Papav. alb.*

℞ *Aq. Plantag. Ros. rubr. & Spermat. Ranar. an. ʒj. pulv. Tutie præparat. ʒj. f. Col- lyrium*, cujus guttæ aliquot instillentur oculis bis



his in die; et non incipiendum, nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur Venesectione semel vel bis, (præcipue si sanguis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Cathartis.

Abstineat ab usu vini & cuiusvis liquoris generosi, ab usu etiam ciborum cocti difficilius, & sale conditorum; & diebus inter purgationes bibat hydrogalem coctam.

Nota, quod sæpe accidit, quod Venesectioni & Cathartici utrunq; repetitis Ophthalmia non cedit; hoc in casu *Paregoric. ex Syr. de Mecon.* ꝑ. singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum suppetiis absolvit.

#### De Uteri Procidentia.

*℞ Cort. Querc. ʒij. Coq. in Aq. font. libv. ad ℥ij. sub finem addendo Cortic. Granator. contus. ʒi. ros. rubr. flor. Granator. an. Mij. acm adde vini rubr. ℥ss. Colatura sit pro foru,* qui cum pannis lencis parti affectæ admoveatur manè horis duabus, antequam de lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec symptomata penitus evanuerit.

#### De Paroxysmo Nephritico.

Ad sunt dolor fixus in lumborum regione, urina cruenta, arenularum aut calculi excretio, stupor cruris è directo ignis laborantis, totius tractio ejus lateris, in quo  
D est

est dolor, nausea & vomitus. Dolor colicus nephritico haud abfimilis; licet in quibuldam symptomatis planè discrepet, quæ recensita in *Capite de Colica biliosa* videas

Si Æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis è brachio affecto reni respondententi ad 3x. dein liquoris possetrici cui Rad. Althææ ʒij. incoctæ fuerint Cong. j. quam citissimè deglutatur; & Enema sequens injiciatur.

℞ Rad. Althææ ʒ Lilior. an. ʒi. fol. Malv. Parietar. Branc. Urfin. ʒ flor. Chamemel. an. M. j. Sem. Lini ʒ Fænugr. an. ʒß. coq. s. q. aq. ad ʒiiss. M. F. Enema. Rejctis Vomitorio & Enemate. Laudan. Liquid. satius magna dosis propinetur, viz. ad gutt. xxv. vel Pil. Matth. gr. xv, vel xvj. In senibus verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiiis (præcipuè si sub initium Paroxyismi urinam eæ reddant nigrantem & sabulosam) Venæsectio omittatur; at quo ad reliqua, eadem quæ dicta est viâ omnino procedendum.

*In mictu Sanguineo à calculo renibus impacto.*

Capiat æger, statò quodam die, singulis hebdomadis, Mannæ ʒiiss. in seri lactis ʒiij. solut.

Conducit aliquando, haustus cerevisiæ tenuis liberalior.

In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obtulus, nullatenus auctus, sed satis tolerabilis perſentitur, nec paroxyſmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger ſe non tutò committeret, niſi prius certò ſciat, calculum majorem non eſſe, quam ut per ureteres viam poſſit invenire, quod, hoc tantum modo, certò poteſt dignoſci, ſi nempe, jam antea, paroxyſmum aliquem nephriticum fuerit perpeſſus, (cum dolore ſcilicet ſæviſſimo in renum alterutro, per ureterem ductus propagato, & vomitu enormi) pro comperto habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguorum congeriem, quorum unus ſubindè in ureterem illabitur atque ita paroxyſmum invitat, qui ſere non deſinit, niſi calculo in veſicam detrufo, cum ſic ſe res habeat, nullum eſt magis efficax remedium, quam aquarum chalybeatarum potatio; quod ſi calculoſus, nullo unquam paroxyſmo nephritico, fuerit tentatus, cum jam major ſit calculus, quam qui ex pelvi poſſit elabi, devitandæ ſunt aquæ ferreæ.

*De Dyſenteria, Diarrhœa & Tenefmo.*

Rigent horrentque, ſequitur deinde totius corporis calor, quem brevi excipiunt ventris tormina, & hæc, dejectiones crebræ, & mucoſæ omnes (niſi quòd ſtercoroſæ nonnun-



quam interponantur) cum ingenti cruciatu  
& molestissimo viscerum omnium quā de-  
icēsu, quoties exoneratur alvus, sanguinis  
interim lineamentis intertextæ, licet aliquan-  
do ne minimum sanguinis per totum morbi  
decursum admisceatur. Progressu morbi  
sanguis sincerus quādoque excernitur, &  
gangrænâ insanabili afficiuntur intestina. Si  
ager ætate floreat, vel cardiacis incalecat.  
Febricitat admodum, lingua est subalbida,  
quadam mucilagine densè obsita; interdum  
nigra & sicca. Prosternuntur vires, dissipa-  
ntur spiritus, aphthæ insuper oris interna  
faucēque obsident, præsertim ubi materia  
peccantis evacuatio adstringentibus præpo-  
sterè impeditur, non exacto per cathartica  
morbi fomite. Aliquando, exulante febre,  
agmen ducunt tormina, & cætera morbi  
symptomata sequuntur.

In diarrhœa humores excrementitii sine  
sanguine aut intestinorum exulceratione ex-  
cernuntur.

In tenesmo assidua est desidendi cupiditas:  
nihil tamen præter mucosum quoddam &  
subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis è brachio quamprimum  
eademque nocte *Paregoricum* propinetur; &  
mane sequenti *Potio purgans communis*, repe-  
tenda alternis diebus ad duas alias vices, &  
*Paregoric.* post Purgationes, quamprimum suc-  
• defunctæ sunt munere; ac diebus à purga-  
tionem

*La... ..  
in ... ..*

tionem vacuis idem manē & serō est exhibendum.

Post Venæsectionem & Catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens Cardiacum exhibeatur.

*R* *Aq. Ceras. nigr. & fragor. an. ℥iij. Aq. Epidem. Scord. comp. & Cinam. hordeat. an. ℥i. Margarit. preparat. ℥ss. Sacchar. cristall. q. s. ad le. Aq. R. sar. Damasce. ℥ss. ad gratum saporis, m. f. Julap. de quo cap. cochl. iv. vel v, in languoribus, vel ad libitum.*

Potus sit Lac coctum cum *Aq. Triplo*, vel *Decoct. A. b. ut*,

*R* *C. C. C. & Mic. panis alb. an. ℥ij. coqu. in. Aq. font. ℥iij, ad ℥ij. postea s. q. Sacchar. Albi. edulcoretur. Vel si dejectio virium postulaverit, Aq. font. ℥ij. cum Vin. Canarin. ℥ss. simul coctæ, pro potu frigide assumantur.*

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui *Laudani* bis vel ter in die repetiti postea incumbit, nisi quod *Enema ex Lact. vaccin. ℥ss. & Theriac. Androm. ℥ss.* subinde injiciatur, quod in alvi egestionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in Diarrhœam tantum assurgat, Phlebotom. & Catharsi præscript. omis, sequ. Bolus singulis matutinis exhibeatur.

R. Rhabarb. pulv. ʒss (plus minus pro ratione virium) cum s. q. Diascordii f. Bolus, addendo Ol. Chym cinnam. gutt. ij.

Noctibus insequentibus Paregoric. ex Aq. cinnam. hordeat ʒi. & Laudan. Liquid. gutt. xiv. exhibeatur.

Ubi tormina sicca sine dejectionibus ex-  
cruciant, curantur diluendo sero lactis frigidi  
propinato, & tepidè injecto ; ut in Cholera  
morbo pullorum juscule aut lacte cerevisie  
fiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeò ut  
omnis ejus vis in rectum intestinum decum-  
bat, cum assidua desidendi cupiditate. Di-  
ara Analeptica instituatur, & liquor aliquis  
Cardiacus pro libitu ingeratur, ut restaurari  
possint vires, quibus redeuntibus, Tenesmus  
sponte se proripit.

In dysenteria malè curata dolores aliquan-  
do ægrius ad annos aliquot discruciant, in  
hoc casu Phlebotomia repetita pristinam sa-  
nitatem restituet.

Notandum est, quòd in constitutionibus  
huic morbo minùs faventibus, omis-  
sis evacuationibus dysenteria Laudano solo sanatur  
quod manè & serò repetendum, donec sym-  
ptomata penitus evanuerint, vel etiam ter  
Nycthemeri spatium, si opus fuerit.



*De Colica biliosa.*

Intestinorum dolor atrocissimus est, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injectâ fasciâ constringit, aut in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certo ad unum aliquod punctum determinatur, neq; tam crebra vomituritio, neq; alvus ita pertinaciter cathartorum vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatius in puncto figitur, vomituritio frequentior, & major alvi adstrictio, colicâ tandem in iliacam transeunte. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem ureteris. Colicus verò vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu colicus dolor augetur: Nephriticus potius imminuitur. 3. In colico dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quàm in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: In colica urinæ ab initio crassiores existunt.

Sanguis è brachio paulò liberalius educatur, & post horas *iiij.* vel *iv.* *Anodyn.* exhibeatur. Postero die *Catharticum Lenitiv.* & interpolito die uno, ad tertiam vicem propinetur.

At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingettis, originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato affatim hausto eluendus est; quo exantlato Anodynum propinandum est; sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minùs peritè tractatus diutissimè fatigaverit, & ægrum pendè confecerit. liberalior sive aquæ Epidem. sive Mirab. sive aliis cujuscunque, qua sanus maximè delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit.

*De cholera Morbo.*

Intra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus, nullo temporis discrimine insurgit, qui licet eodem curretur modo, alterius tamen est subiecti. Adfunt vomitus enormes, ac pravorum humorem cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis; pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, curum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in 24 horarum spatio interimunt.

Pul-

Pullus tenerior in tribus circiter Aq. font. Congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel (defectu ejus) liquoris potsetici capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successivè repetenda. *Hautibus & Clysteribus Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymph. eorumve* alicuius uncia subindè admisceri poterit.

Exantlato hoc Eluvionis penso (quod *iiij.* vel *iv.* horas sibi vendicat) *Paregericum* curationi *Coronidem* imponit.

Si non accesserit medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus, & jam frigescant membrorum extrema, tum ad *Laudanum Liquidum* confugiendum est in paulò maiori dosi, (viz. *Laudan. liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. 3i.*) & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum; at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam cholæræ morbi infantibus valdè familiaris, ac sæpenumerò funesta, ex Dentitione vel Crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minimè fert, ut disuatur ventriculus largâ liquorum potatione, multo minis ut Catharticis tumultus major in humoribus excitetur, sed Curationem *Lau-*



dano solo aggredi oportet ; quamobrem  
gutt. ij, iij, vel iv, vel plures, pro ratione  
ætatis, Cochlear. j. cerevitæ tenuis vel Aqua  
cululvis appropriatæ intillatæ exhibeantur  
repetanturque, ut opus fuerit.

#### *De colica Pictonum.*

Est species quædam Colicæ, quæ degene-  
rare solet in Paralyfin, & motûs omnimodam  
manuum ac pedum depravationem ; quam  
hoc nomine *Riverius* in capite de Paralyfi  
indigitat, & apud insulas Caribum notissimam  
est ; utpote, quæ magnam vim hominum  
infestat.

Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsamum*  
*Peruv.* frequenter ac in magna dosi exhibitum  
nempe si ejus gutt. xx, xxx, vel xl. *Saccharum*  
*Albiss. cochl. j. instillantur*, & bis vel ter in die  
dantur : at Paralyfis huic remedio haud cedit.

#### *De iliaca Passione.*

Peristalticus intestinorum motus invertitur  
rur, propinata cathartica & injecta enemata  
in emetica statim transeunt, alvi fæces per  
vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ℥iij,  
vel x. post aliquot horas exhibeatur sequens  
Pulvis.

℞ *Resin. Scammon. vel (defectu ejus) Resin.*  
*Falap. gr. xij. Calomelan. Torquet. ʒi. m. f.*  
*Pulvis ;*

*Pil'vâ* ; cap. d. *Cochl. i.* lactis vaccini, superbibendo ejusdem lactis *Cochl. j.* vel alterum; vel si forma *Pilularum* magis arrideat :

℞ *Pil. ex duob. ʒß. Calomel. Torquet. ʒj. cum f. q. Balsam. Peruv. f. Pil. iv. sumend. d. Cochl. j. Syr. Violarum.*

Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, *Laudan. Liquid. gutt. xxxv. Aq. Cinnamon. fort. ʒß.* instillatæ statim propinentur; cum vero horum usu vomituritio, ac ventris dolores, remiserint, catharticum dictum iterum exhibeatur, verum si anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis vomituritio ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore restitante, ad utrum paregorici supra descripti revertendum; idemque eò usque repetendum quartâ vel sextâ quâque horâ donec intestinis quies omnino inducatur, quo quidem tempore catharticum operationem suam per sedes exeret.

Nec sanè abs re fuerit elapsâ horâ unâ, aut alterâ, post *Venæsectionem*, clysterem aliquem, ex iis qui potentiùs operantur, injicere, fumum scilicet nicotianæ, ex tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissimè insufflatum, quæ quidem operatio post aliquot horas reiterari debet, nisi citius meatus deorsum pateat.

Finitâ

Finitâ operatione Cathartici, sumat frequentem haustum.

℞ *Aq. Cinnam. fort. ʒi. Laudan. Liquid. gutt. xxv. m. f. Haustus*, qui porro repetendus est bis, ter, vel sæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus cessaverint; atque, etiam, istis symptomatis cessantibus, nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori dosi cubitum iturus.

*De Fluxu Mensum immodico.*

Menstruorum fluxus, naturaliter constitutus, capacitatem testæ ovi auserini implet. Patet autem immodicus ex difficili tolerancia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescencia.

Mittatur sanguis è brachio ad ʒviij. sequenti mandè sumatur *potio purgativa communis*, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices; & noctibus post purgationem *Paregoric. è Syr. de Meom.* exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis sumat frequentia.

℞ *Conserv. Rosar. sicc. ʒij. Trochisc. de terra Lemnia ʒiss. Cort. Granator. Corall. rub. præparat. ʒboli Armen. an. ʒij. lapid. hematit. Sanguin. Dracon. an. ʒj. cum s. q. Syr. Cydonior. f. E. & T. de quo sumat ad magnitudinem*



nem nucis moschat. maj. mandè & hora quinta pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. *vj.*

*Rx* Aq. Germin. Querc. & Plantag. an. *℥iij.*  
Aq. Cinnamom. bordeat; & Syr. de Rosis siccis  
an. *℥i.* Sp. Vitriol. q. s. ad gratiam aciditatem.

*Rx* Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur simul, & succus exprimatur, & postea clarificetur, de quo cap. Cochl. *iv.* vel *v.* sæpiusculè ad libitum.

Post primam purgationem applicetur emplastr. seq. regioni Lumborum.

*Rx* Emplast. de Minio & ad Herniam an. part. *æj.* extendantur super alutiam, f. Emplastrum regioni Lumborum admovendum.

#### *De Colica hysterica.*

Est species quædam, seu potius insigne ac valdè usitatum affectionis hystericæ symptoma, cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum Cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primo, quò Saburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediatur Paregorici efficaciam, satis magna quantitas liquoris possetrici affatim ingurgitetur, atque iterum

iterum per vomitionem reiciatur, nempe  
*ejusdem liquoris Cong. iss*, quo peracto *Laudan.*  
*Liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. Aq.*  
*Epidem. vel alius vehiculi zi.* propinentur.

In usu Paregoric. hoc notandum, quòd  
 eò usque repetendum est, donec symptoma-  
 ta omnia penitus cessaverint, debitum interea  
 tempus interjiciendo ; ut dijudicare valea-  
 mus, quid prior dosis effecit, antequam no-  
 vam ingeramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit  
 æger, vel si antea hoc symptomate haud mul-  
 tum infestatus fuerit ac viribus fractus, hoc  
 in casu sanguis primùm è brachio detrahen-  
 dus antequam vomitorium præscriptum pro-  
 pinetur.

Hâc ipsâ Methodo Clavus hystericus cu-  
 ratur. Sin verò Colica HystERICA diutur-  
 nior fuerit per Paroxysmos affligens : tum  
 in eorum intervallis, sive extra Paroxysmum,  
 seq. usurpentur.

℞ *Zedoar. subtiliss. pulv. ʒj. cum s. q. Syr.*  
*è conditur. citri, f. Bolus,* sumendus manè &  
 serò per xxx dies, superbibendo sequentem  
 infusionem.

℞ *Zedoar. incis. minutim. ʒß. vini Canar.*  
*ʒiv, infundantur frigide per xij horas; deinde*  
*colentur pro usu; vel Balsam Peruv. ut in*  
*Colica Pictonum;* usurpetur.

Quæ

Quæ de Colica Hysterica hîc dicuntur, de Colica etiam hypochondriaca dicta sunt; ut & hoc diligenter advertendum.

Utriusque affectûs natura sibi vindicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tamen si ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica Hysterica tam in hypochondriacis, quam hystericis sæpiissime in icterum desinit, qui sensim sponte suâ facessit, sin autem longas moras nectat, exhibeatur Apozema sequens.

*R. Rad. Rub. Tinctur. curcum. an. ʒi. chelidon. maj. cum toto ꝯ summitat. centaur. min. an. M. j. coq. in Equalib. partibus Vini Rhenani ꝯ Aq. fontan. ad ℥ij. colatur. dissolv. Syr. de 5 radicibus ʒij. m. f. Apozema, de quo capiat ℥ss. calidè manè & serò, usque dum convaluerit.*

*De Ictero, colicâ neuti quam prægressâ.*

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta, corporis pruritus, segnities, & lassitudo, linguæ amaror, vomitus biliosus interdum, singultus, egestio alba, urina crocea & pannum immersum eodem colore inficiens, morbum indignant.

Ex-



Exhibeatur *potio purgativa communis*, dein aggrediatur usum sequentium ; & durante eorundem usu, Catharticum præscriptum quarto quoque die exhibeatur.

℞ *Conserv. Absinth. Rom. conserv. flaved. Aurant. an. ʒi. Angelic. condit. nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & chalyb. cum aceto preparat. an. ʒss. Extract. centaur. min Extract. Gentian. & cremor. Tartar. an. ʒij. croc. Anglic. pulv. ʒss. cum s. q. Syr. de 5 radicibus f. Electuarium*, de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quinta pomeridianâ (vel vice Electuarii sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosim *aquarum mineralium purgantium* ℞v. & post pomeridianam dosim *Apozemat. in colica hysterica descript. ℞ss.*

At si signa hydropis affuerint, tam manè quàm serò apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obstiterit, ad *aquas ferreas* eundem est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

#### *Ad præcavendum abortum.*

Eadem præscribenda, ac in Fluxu mensium immodico, omi.sis solummodò catharsti & succis.

#### *De immodico lochiorum fluxu.*

Fluxum lochiorum naturalem tria constituunt, sanguis scilicet purus, copiosus, per tri-

triduum primum fluens ; dehinc sanguis aquosus, loturæ carniū crassiori similis per quadriduum præter propter durans ; hinc postmodum materia viscosa & mucilaginosâ, paucò aut nullo sanguine permixta, per quinque aut septem dies prædians, & sic perro ad mensis finem.

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus est ex virium defectione, animi deliquio, sanguine grumoso effluente, cibi fastidio, dolore in hypochondriis, ventris tensione, pulsu debili & frequenti, visus obtenebratione, aurium tinnitu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituitur, & potus sequens addatur.

℞ *Aq. Plantag. vin. rubr. an. ℥ij. coq. simul ad tertias, & deinde edulcoretur s. q. sacchar. albiss.* cujus, cum frigescat, cap. ℥ss. bis vel ter in die.

Interim Julap. aliquod Hystericum (at satis mite) subinde propinetur, & nodulus sequens naribus applicetur.

℞ *Galban. Ase fetid. an. ℥ij. castor. ℥iss. sal. succin. volatil. ℥ss. m. f. nodulus,* vel

℞ *Sp. salis Ammoniac. ℥ij. quem saxe olfaciat.*

#### *De suppressione Lochiorum.*

Intumescit venter, dolor gravativus inum ventrem, lumbos & inguina occupat, facies

rubescit, difficilis est respiratio, perturbantur oculi, rigores, febres acutæ adfunt, animi deliquia, sunt lores frigidi, pulsationis & ardoris sensus in utero, paralýsis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & *Emplast. hystricum* umbilico admoveatur quamprimum, *Elect.* seq. adhibeatur.

*Rx* *Conserv. Absinth. Rom. Rut. an. ʒi. Trochisc. è Myrrh. ʒij. Castor. croc. Anglic. sacchar. volatíl. Sal Armoniac. ʒ. Asæ fætid. an. ʒss. cum s. q. Syr. è 5 radicib. f. Elect. cap. acc. magnitud. nuc. moschat. quartâ quâq; horâ superbibendo seq. Julap. Cochl. 4 vel 5.*

*Rx* *Aq. Rutæ ʒiv. Bryon. compos. ʒij. Sacchar. cand. q. s. f. Julap. vel sumat Trochisc. è Myrrh. ʒj. quartâ quâque horâ.*

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & Lochia adhuc supprimantur, *Laudanum* unicâ saltem vice exhibendum ut, *Laudan. Liquid. gutt. xiv. in Aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. gr. iß. cum Asæ fætid. ʒss. in pilulas duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum *Enema* ex lacte *Saccharato*, unicâ saltem vice, injiciatur.

#### *De Hydrop.*

Foveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ manifestæ evanescentes hoc malum primum indicant. maximè



maximè si spiritus interim ægris ducatur (haud rarò tamen fæminæ prægnantes, & quibus catamenia sistuntur, ut & viri ab asthma in veterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribûsque ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis suæ limen paulatim distendunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis facto æger submergitur. Pro rata qua partes à morbo obsessæ mole augmentur, aliæ magis magisq; gracilescent, urgentibus dyspnœâ, urinæ paucitate, & siti intensâ. Viros, ingravescente ætate; fæminas, ubi jam parere desierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ sunt primò ad aquarum evacuationem, deindè ad instaurandum sanguinis robur; quò novus aquarum proventus præcaveri possit.

℞ Vini albi ℥iv. Jalap. subtiliss. pulv. ʒj  
Zinzib. pulv. ʒss. Syr. de Spin. Cervin. ʒi. M.  
f. Potio, sumenda summo mandè, repetendâq;  
singulis vel alternis diebus, pro ratione vir-  
rium, donec partes affectæ detumuerint;  
vel,

℞ Tamarind. ʒss. fol. Senn. ʒij. Rhei. ʒiss.  
Coq. in f. q. aq. ad ʒiij. in Colatur. dissolv.  
Mannæ & Syr. Ros. solut. an. ʒi. Syr. de Spin.  
cervin. ʒss. Elect. è succ. Rosar. ʒiij. M. f.  
Potio, sumenda, ut supra; vel,

℞

℞ *Pil. ex duob. ʒj. Elater. gr. iij. Ol. Chym. Caryophyl. gutt. ij. f. Pil. N° iij. cap. summo manè, reperanturque, ut opus fuerit; vel,*

℞ *Gambuzii gr. xv. vin. alb. ʒ aq. Ciel' or. an. ʒiſs. Syr. de Spin. Cervin. ʒſs. m. f. Potio. ſumenda ut ſupra; vel,*

℞ *Cortic. interior. Sambuc. è ligno deaſi M iij. coq in aq. ʒ laet. partibus aq. miſtorum iij. ad ſij. Colaturæ capiat dimidiam partem manè, & alteram ſerò quotidie, donec conualeſcat. At hoc remedium, niſi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.*

Circa uſum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda ſunt.

Primo, utrùm ægri corpus facilè an verò difficulter Catharticis cedere ſoleat, cùm in iis qui facilè purgantur *Syrup. de Spin. Cervin. ſolus ad ʒi. exhibitus* aquas ſat copioſè eliciat, in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica ſupra deſcripta, utut valida, vix ſcopum attingant.

Secundò, Cathartica omnia, quæ ſegnitiſ operantur, magis officiunt quam proſunt; quamobrem purgatio paulò fortior & nimia, ſaſto debiliori eſt præferenda.

Tertio, Aquæ cā maximâ celeritate exhauriri debent quam ægri vires ferre queant: ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aq. denuò affatim colligantur.

Est

Est autem ubi medicamenta omnia, quæ-  
 liscunq; demum generis, quæ alvum movent,  
 prius omitti possunt ac debeant; quoties  
 enim ager constitutione est infirmiori, vel  
 scilicet vaporibus obnoxia, aquarum eva-  
 cuatio L. uetricis solum committenda, inter  
 quæ ea sunt efficacissima, quæ ex salibus  
 Lixivialibus sunt; ut,

℞ Cinerum Genistæ ℥j. infundantur frigide  
 in vini Rhenan. ℥iv. liquoris per filtrationem  
 colati ℥iij. mand. quinta pomeridianâ & sero  
 singulis diebus exhibeantur, uq; dum humor  
 evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis Calefacientia  
 & corroborantia medicamenta usurpanda;  
 ut,

℞ Rad. Raphan. Rustican. fol. cochl. hor-  
 tens. absinth. vulgar. Sal. summitat. centaur.  
 min. & Genistæ, infundantur in cervisia forti  
 pro potu ordinario, qui potus incipienti hy-  
 dropi aliquando sine Catharticis subvenit,  
 vel sequent utatur;

℞ Consero Cocchl. hortens. absinth. Roman.  
 an. ʒi. Extract. Gentian. Absinth. vulgar. &  
 Centaur. min. an. ʒiij. cum s. q. Syr. & cortic.  
 citr. f. Electuarium, de quo sumat ad quan-  
 titatem nuc. moschat. maj. mand. quinta po-  
 meridianâ, & vesperi, superbibend. ʒiv. se-  
 quentis infusionis.

℞



℞ Rad. Gentian. ℥i. summitat. Genist.  
Centaur. min. ℥ Absinth. vulgar. an. M. j,  
Sem. fœnicul. ℥ Petroselini an. ℥ij. incis. mi-  
nutim affunde vini Rhenani ℥iv. stent simul  
in infusione frigida, & coletur solummodo  
tempore usûs.

Notandum, cùm ad corroborantium usum  
deventum fuerit, ægrum nullo modo esse  
purgandum, tantisper dum sanguinis corro-  
borationi navetur opera.

Quod & per salium Lixivialium usum  
omnino observandum, quo quidem tempore  
pariter corroborare convenit.

℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥iij. fol. Cochl.  
Hortens. absinth. vulg. salvia, summitat. Cen-  
taur. ℥ Genistæ, an. M. iij. Aurant. incis.  
Nº iij. Infundantur in Congiis vj. Cerevisiæ  
fortis non lupulatae, inter fermentandum; sit  
pro potu ordinario.

#### *De Gonorrhœa virulenta.*

Corripiunt dolor genitalium insolitus, &  
oratio testiculorum, in non recutitis macula  
morbilli æmula glandem occupat, statim à  
cujus exortu liquor, seminis instar, exstillat,  
qui quotidie à seminis colore & consistentia  
recedens flavescit tandem dilutius ovi vitello;  
in lue virulentior virescit, & aqueo humori  
permiscetur sanguine tincto. Pustula dicta  
ulcus fit, aphthis infantum simile, indies  
latius & profundius depascens, superveni-  
ente

ente orificii callo. Verpi non glandis ulcere, solà Gonorrhœa tentantur. Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur, quasi manu transversus fortiter constringeretur, noctu præcipuè urget, dum æger lecto incalescit. Curvatur penis à fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis, sed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maximè quâ in glandem definit. Carunculæ lotii exitum quandoque impediunt; & scroti dolor ac inflammatio nonnunquam superveniunt.

*R Mass. Pil. Coch. maj. ʒiij. Extract. Rud. ʒi. Resin. Jalap. & Diagryd. an ʒss. cum s. q. Opobalsam. f. Pilul. è singulis drachmis vi, cap. iv. singulis Auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis, admodum imminuantur. Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.*

In iis, qui difficulter purgantur, subindè intercalari possit potio communis purgativa, cui addantur, *Syr. è Spin. Cervin. & Elect. Succ. Rosar. an. ʒii. vel, curatione minùs sæliciter succedente Turbith. Minerale ad gr. viij. exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis, vel vice Turbith. Mineral.*

*Rx Pil. ex duob. ʒss. Merc. dulc ʒi. cum f. q. Opobalsam. f. Pil. ʒv. Iumino mane sumenda.*

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, post pilulas prius descriptas, tribus Auroris continuis sumptas, tum mandè & horâ quintâ pomeridianâ quotidie injiciatur Clyster sequens nisi quod semel aut bis in hebdomade, omisso Clytere, Cathartic. imperandum.

*Rx Elect. è succ. Rosar. ʒvi. Terebinth. Venet. Vinello crâ solut. ʒss. dissolvantur in Aq. hord. ʒii. Colatur. adde Syrup. Violar. ʒii. M. f. Clyster.*

Singulis noctibus cap. *Opobalsam. vel Balsam. è Mech. gutt. xxv. Sacch. frustulo exceptas.* Hujus defectu *Terebinth. Cypr.* ad quantitatem *Avellane* substitui possit.

Sit pro potu hydrogala; at Cerevisia tenuis in pastibus.

Vel sequentem methodum aggrediatur.

*Rx Pil. ex duob. ʒss. Opobalsam. gutt. iii. f. Pil. N° iii. Cap. horâ quartâ matutinâ, superdormiendo, repetanturq; alternis diebus, vel tertiâ quâque die.*

Diebus à purgatione vacuis injiciatur mandè & horâ quintâ pomeridianâ Clyster supra descriptus.

Procedente curatione (quâcunq; eâ demum methodo tentetur) sanguis sub mediam cura-



curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incrassans præscribatur, & medicamenta iisdem virtutibus pollentia, quæ sunt *hydrogala, Emulsiones ex seminib. frigid. &c.*

Si Penis Tumore afficiatur.

℞ *Rad. Althææ, Lilior. an. ʒiʒ. fol. Malv. Verbas. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamemel. Melilot. an. M. j. sem. Lini, Fænugrec. an. ʒʒ. coq. f. q. Aq. font. & f. fotus* parti affectæ admovendus per horæ unius spatium bis vel ter in die.

Peractâ fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. Lin. rec. extract. dein. *Emplast. è mucilag. inibus alutæ agninae inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si Ulcus in præputii labiis, vel in subjecta Glande, hæreat, tum sequens Linimentum præscribatur.

℞ *Unguent. Basilic. ʒvj. Unguent. Nicotian. ʒij. præcipitat. Aq. Rosar. loti & optimè levigat. ʒʒ. M. f. linimentum*, quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post fotus præscripti usum.

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanguis è brachio extrahatur, atque bis in die fotus præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. fotubus addendo *Sp. vin. Gallic. Cochl. j. vel*

E

al-

*alterum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum ejus loco applicandum.*

Catharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

*De Lue Venerea.*

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebitis astringentium usu labes sanguini imprimitur exoritur Lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artubus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos, crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar savi flavescent. Quo magis scabies diffunditur, tanto minùs æger discrucietur. In cranio, tibiis, bacillisq; exostoses, ossium inflammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus, sed fœces ut plurimum primò aggrediendia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata mox eam absorbunt ita ut fulcro destitutus nasus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbantur, pereunt per vices membra; lacerantur donec cadaver, & jam Superis grave humore condatur.

*Rx Axung. Porc. ʒij. Mercur. crud. ʒi. M. Linimentum, in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibiae ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.*



Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tum *gr. viij. Turbith. mineral. in Conserv. Rosar. rubr. exhibeantur aut corporibus minus robustis, Mero. dulc. ʒj.* Sed si salivatio jam incoepta prius elanguescat, quàm symptomata penitus disparuerint, extimulanda subindè est eadem dosi Mercur. dulc.

Ptyalismus ita moderari debet, ut *ʒiv.* Nycthemeri spatio expuat, aut circiter.

Si iusto altius exurgat Ptyalismus, cum inflammatione nimia, atq; id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea; at sint ea, quæ prius usurpata fuerint.

Si Diarrhœa supervenerit (quod plerunq; accidit antequam salivatio bene assurgat) tunc sistenda est usu Laudan. Liquid. ita dosin augendo atq; repetendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, *Aq. Ros. Damascen. vel lacte Aq. permisto, vel seq. decoct. idem coluatur.*

*R. Rad. Alth. Hord. mundat. an. ʒi, sem. Cydonior. ʒʒ. coq. f. q. aq. ad ʒij. M. f. Gar-garisma, quo sæpius utatur.*

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in Catharsi imperanda, nisi quodd primis



aliquot diebus liquore possético, jusculis avenac. hordeac. ac cerevisiâ tenui repositâ nutriatur.

His omnibus ritè peractis (etiâ si symptomata omnia evanuerint, ac subindè morbus penitus profligari videatur) quo minùs recidivam postliminèd pariat, ægro semell in septimana per 4 vel 6 vices, *Merc. dulc. ʒj.* exhibendus, utcunq; bene se habeat, & etiâ si jam domo egrediatur.

*De Fluore albo.*

Quod effluit, modò album, modò pallidum, flavum, viride aut subnigrum, modò acre & erodens, tetrum quandoq; & graveolens, decoloratur facies, dolet spina dorsi, prostermitur appetentia, oculi pedesque intumescunt.

Mittatur sanguis è brachio ad ʒviij.

*Rx Pil. Coch. maj. ʒij. Castor. gr. ij. Balsam. Peruv. gutt. iij. f. Pil. N° iv. cap. horâ quartâ matutinâ, superdormiendo; repetanturq; per duas alias vices interponendo diem unum vel alterum. pro ratione virium.*

*Rx Aq. Rut. ʒiv. Aq. Bryon. comp. ʒij. Sacchar. Crystall. q. s. f. Fulapium; Cap. Coch. iij, vel iv. in omni languore; deinde aggrediatur usum sequentium.*

℞ Theriac. Andromac. ʒiʒ. Conserv. flaved.  
 Aurant. ʒi. Diascord. ʒʒ. Zinzib. condit. &  
 nuc. moschat. condit. an. ʒiij. Pulv. è Chel. cancr.  
 comp. ʒiʒ. cort. exterior. granat. Rad Angelic  
 Hispan. corall. rubr. præparat. & Trochist. de  
 terra Lemnia an. ʒi. Boli Armen ʒij. Gumm.  
 Arabic. ʒʒ. cum s. q. Syr. de Rosis siccis f.  
 Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc.  
 moschat. maj. mar. è. horâ quinâ pomeridia-  
 nâ, & nocte per mensem integrum, superbi-  
 bendo sequent. infusionis Cochl. ʒj.

℞ Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic.  
 Calami Aromat. an. ʒss. fol. Absinth. Roman.  
 Marrub. alb. centaur. min. Calamenth. vulgar.  
 salv. sicc. an. M j. Bac. Junip. ʒi. incidan-  
 tur minutim & infundantur in Vini Canarini  
 ʒiij. Stent simul in infusione frigida, coletur  
 tantummodò tempore usûs.

Vescatur cibus eupeptis, & abstineat ab  
 usu olerum & fructuum qualiumcunque &  
 singul. pastibus bibat vinum Hispanicum.

#### De Diabete.

Succi sanguini illati per vias urinarias  
 crudi & inconcocti exitum sibi quærunt,  
 unde sensim labefactantur vires, colliguescit  
 corpus, & quasi substantia ejus per hanc clo-  
 acam exinanitur, cum siti, ardore viscerum,  
 lumborum coxarumq; intumescentiâ, & sa-  
 livæ spumosæ expuitione crebrâ.

E 3

Eadem

Eadem præscribenda sunt, quæ in fluore albo, omittis solummodò Venæsectione & Catharsi.

*De Doloꝛe Hemorrhoidum.*

Intensissimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conterspergitur: Nonnunquam tumores verruciasimiles in sphinctere delitescunt; vel in margine ani apparent.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒx.

℞ Sem. Melon. Pepon. an. ʒss. sem papaw alb. ʒij. Amygd. dulc. excorticat. N° v; contundantur in mortario marmoreo, sensim affundend. Aq. Hord. t̄bss. Aq. Rosar. ʒij. Sacchar albiss. q. s. f. s. a. emulsio; cap. ʒiij. sæpius cule.

℞ Flor. Sulphuris, Pulv. Glycyrrhizæ Salviæ an. ʒi, cum f. q. Balsam Lucatell. f. Pil. e sing. drachm. vi; cap. iij, ter in die, superbibend. Emuls. præscriptæ Cochl. vi.

℞ Aq. Spermat. Ranar. ʒiv. in qua dissolv. Lithargyr. ʒii. Opii ʒi; f. mixtura, cujus tantillo Linteum madefactum parti affectæ applicetur, vel si tumor intus lateat

Cochl.



Cochl. iii. ejusdem mixturæ modo Clysteris injiciantur.

Pro Potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei ; & à carnis usu abstineat. Singulis noctibus sumat Diacodium.

*De fluxu Hæmorrhoidum immodico.*

Innotescit ex viribus prostratis, copia & diuturnitate sanguinis excreti, sædo corporis colore, ad citrinum (ut in ictero) vergente. Succedit cachexia, & deinde hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensesum immodico, omisâ solummodò Catharsi.

*De Epilepsia Puerorum.*

Vel primo mense aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus (quo in casu *Diascordium ad quantitatem grani piperis in Aq. Saxifrag. aut lacte materno solutum*, & exhibitum præstantissimum est remedium.) Vel circa dentitionis tempus, à septimo ad decimum mensem, rufi comitata est, aut (quod multo deterius) vomitu & diarrhœâ, viridia (ut solent hystericæ) egerente infante. Quandoq; improvisò occupat paroxysmus, os

oculosque distorquens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens; quandoque præsentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolita oculorum orbitalium immobilitate. Nunc seriùs, nunc ocyùs se proripiunt paroxysmi, certâ subinde periodo, vago aliàs insultu revertentes; sed, appetente morte, à tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in soporem proclives sunt infantes, donec à novo resuscitentur insultu.

Applicetur *Emplastr. Epispastic.* cervici quamprimum.

*Rx Aq. Epilept. Lang. ziiij. Laudan. Liquid. gutt. j, vel ij, vel plures, pro ratione ætatis, Syr. Pæon. ʒj. M. f. Haustus, sumendus quamprimum.*

*Rx Aq. Ruta ziiij. Aq. Epilep. Lang. & Aq. Bryon. comp. an. ʒi. Syr. caryophyll. ʒss. M. f. Fulap. cap. Cochl j. singulis horis, si haustus præscripti, paroxysmum non fugaverit.*

#### *De Rachitide.*

In Rachitide adsunt partium laxitas & mollities, debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio,  
viz.

viz. caput iusto majus, facies plenior & floridior, partes carnosæ infra caput emaciantur, nodis protuberant articuli, maximè carpi, paulo minùs radii, rument & extremitates costarum, ossa incurvantur, præcipuè tibix & fibulæ, hinc ulnæ & radii, aliquando femoris & humeri, dentes rardè & molestè erumpunt, vacillant, nigrescunt, & frustulatim excidunt, pectus à lateribus angustum, anteriùs acuminatum, abdominis repletio, & hypochondriorum tensio, tussis & pulmonum vitia laceffunt, lateralis decubitùs modò dextri, modò sinistri aversatio.

R<sup>2</sup> Fol. Absinth. Vulgar. centaur. minor. Marrub. Alb. chamædryos, Scordii, calan. anth. vulg. Parthen. Saxifrag. pratens. hyper Virg. aureæ, Serpill. menth. salv. Ruæ card. Benedikt. Puleg. Abrotan. chamæmel. Tanacet. Lilior. convall. omnium rec. collect. & mis. an. M. j. axung. Porcin. ℥iij. seu. vin. & Vin. clarct. an. ℥i. macerentur in oleo Rosili super cineres calidos per horas x. deinde coalliant ad humiditatis consumptionem. & postea colentur. ut j. Linimentum quo ventri & hypochondria illuminantur omniè & sero ut etiam & artus hoc malo affecti, per 30 vel 40 dies, vel donec convalescant.



*R. Singulor. ingredient. præscript. an. Mij.*  
 infundantur frigide in Cerevisiæ non Lupu-  
 lat. Cong. *iiij.* pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occupan-  
 tibus ab Evacuationibus nimis proceden-  
 tibus.

Sanguis & Viscera herbis corroboranti-  
 bus confortentur, ut in Rachitide vera; nisi  
 quod axillæ etiam utræque inungantur, artus  
 non artus.

#### *De Febribus à Dentitione Ortis.*

*Sp. C. C. gutt. ij, vel iij, vel iv. pro ra-*  
*tione ætatis in Cochl. j, vel altero Aq. Ce-*  
*rasor. nigr. vel Julap. alterius appropriati,*  
 exhibeantur quarta quâque horâ ad vices  
 quatuor, vel sex.

#### *De Febre hectica Infantum.*

Sine insigni calore languent cum appeti-  
 tûs dejectione, artus & truncus corporis ema-  
 ciantur.

*Rhabarb. incisi ʒij. in lagenam vitream*  
*cerevisiæ tenuis ℥ij. capacem immittantur pro*  
*potu ordinario.*

Epoto

Epoto hoc liquore, alie ꝑij, eidem Rba<sup>m</sup> barb. superaffundantur ad tertiam vicem.

Si verò potus vi Catharticâ saturatiùs impregnetur, tum ꝑij. epotâ alteri cerevisia mox adjiciatur.

#### *De Tussi Puerorum Convulsiva.*

Phlebotomiâ, & repetitâ Catharsi, eâque solâ, expugnatur hæc tussis, malum aliàs pertinacissimum, & fere insuperabile; sed leniora tantum cathartica hic conveniunt, eaque, cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

#### *De Hæmorrhagia Narium.*

Dolor & calor sinciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victûs ratio refrigerans & incrassans injungatur; Julap. refriger. & incrassans, Cum Emulsionib. refrigerantib. præscribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atq; omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur & semel vel bis *potio purgativa commun.* præscribatur.

*Lintea quadruplicata immersa Aq. frigida, in qua sal Prunell. dissolvatur, & postea leviter expressa admoveuntur nuchæ, & utrinq; cervici sæpius in die.*

Post

Post Evacuationes liquor seq. applicetur.

℞ *Vitriol. Hungaric. & Alum. an. ʒi. Phlegmat. Vitriol. ℥ss. Coq. tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigefactum filtra, & à Crystallis subinde natis separa, liquori residuo adde Ol. Vitrioli duodecimam partem; vel potius.*

℞ *Aq. Plantag. ʒiij. Bol. Armen. subtiliss. pulver. ʒss. probè misceantur; Turunda ex linteo raso liquore hoc humectata nari, ex quo sanguis stillat, indatur per dies duos istic relinquenda.*

Hoc minus succedente, *Vitriol. Rom. Aq. commun. dissolvatur, qua Turunda imbuta nari indatur, liquore etiam hoc linteamina imbuta, & applicata sanguinem sistunt si ex parte externa diffuat.*

#### *De Chlorosi.*

Adsunt vultûs & totius corporis decoloratio, intumescencia in facie, palpebris & malleolis, gravitas totius corporis, crurum ac pedum tensiva lassitudo, respiratio difficilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulsus febrilis, somnolentia, pica & mensium suppressio.

Sumat



Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *Pulv. Chalybeatum* in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbibend. hauustum vini cujuslibet ad libitum, vel infusion. corroborant. cum Rad. Angelic. ibidem descriptam. Si *Ægra* non valde debilis fuerit, purgetur semel vel bis ante præscriptorum usum.

*De Suppressionione Mensium.*

Cibum fastidiunt mulierculæ, fœdus faciei color est, gravitas totius corporis dolores scapularum, lumborum, crurum & imi ventris; pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesserit, tum seq. sunt præscribenda.

Singulis Auroris, & quartâ pomeridianâ, sumat *Zulap. Hysteric. sine Casar. Trachl. v. instilland. Sp. C. C. gutt. xij.* Singulis noctibus sumat cubitum itura *Trochisc. de Myrrh. ʒj. cum Syr. de Artemis. in formam boli vel Pil. Redact.*

*De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hæmoptoe.*

In Hæmoptoe dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad 3x  
Sequenti mane sumat *portionem purgativam*  
*commun.* & eâdem nocte *Paregoric. ex 3iij*  
*Aq. Cerasor. nigr. & Syr. de Mecon. 3i.*

Postea aggrediatur usum sequent.

℞ *Bol. Armen. 3i. Pulv. Radic. Symphit.*  
*3ij, Terr. Sigillat. Lapid. hæmatit. & Sangui.*  
*Dracon. an. 3j, Sacchar. Albiss. ad pondus*  
*omnium ; M. f. Pulvis subtilissimus, cujus*  
*cap. 3j, manè quintâ pomeridianâ, & nocte*  
*superbibend. sequent. Apozemat. 3iv.*

℞ *Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, & mil-*  
*lesol. an. M. j. coq. s. q. Aq. ad 1/2, im-*  
*Colatura dissolv. Syrup. de Symphyt. 3ij*  
*M. f. Apozema ; vel cap. Cochl. vj. sequent*  
*Tincturæ.*

℞ *Flor. Ros. rubr. 3vj, Cort. interna*  
*querc. 3ss. sem. Plantag. parum contus. 3iij*  
*Aq. font. 1/2ij, Sp. Vitriol. q. s. ad levem aci-*  
*ditatem, infundantur in vase clauso, calore*  
*leni, per 4 horas ; Colatur. adde Aq. cinnam.*  
*Hordeat. 3iij. Sacchar. Albiss. q. s. ut f. Tim-*  
*Gura gustui grata.*

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur E-  
lectuario in fluxu mensium immodico præ-  
scripto.

Enema quotidie injiciatur, & Diacodium  
horâ somni propinetur.

Phle-

Phlebotomia insuper semel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpositis; & semel iterum, si res postulet, repetatur potio purgativa.

Diæta incrassans & refrigerans observanda.

### *De Punctura Tendinũ.*

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ jugiter destillar.

℞ Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad teneritud. coct. & contus. ℥iv, farin. sem. Lin. & Avenac. an. ℥iij. coq. ad cataplasmatibus consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere, applicetur parti affectæ manè & serò.

### *De Ambustis.*

Foveatur pars affecta linten Sp. Vini imbutis, usque dum evanescat dolor, ac deinceps de novo imbuatur linteam, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur.

De



*De Mania communi.*

A nimis exaltata & vivida sanguinis crasi oritur. Est & alia mania species febres intermittentes diuturniores excipiens, in stultitiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vappiditate sanguinis, à diutina fermentatione. Præscribantur itaque cardiaca generosiora, viz. *The-riac. Andromach. Electuar. de ovo, Pulv. Comitiss. Pulv. Gualt. Rawleigh, in Aq. epidem. theriacal. vel aliâ*; & diæta instituantur analeptica.

In junioribus mittatur sanguis è brachio ad *ʒviij*, vel *ix*, bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæsectiones Interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti Cathartico, quod sumat tertiâ vel quartâ quâq; die, donec convaluerit, hoc interim observando, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

*Rx Pharmac. domestic. (i. e. Rad. Bryon. alb.) pulv. ʒj. lactis vaccin. ʒiv. vel,*

℞ *Ejusdem* ℥ss, *vel* ℥vj, *Vin. alb.* ℥iv. *infundantur per noctem, in colatura dissolve Syr. Violar.* ℥i, *M. f. Potio* ; *vel,*

℞ *Gambugii gr.* xiv, *Aq. Cerascr. nigr.* ℥iij, *Syr. Caryophyll.* ℥ss, *f. Potio.*

### *De Contusionibus.*

Mittatur sanguis è brachio lateris magis affecti ad ℥x, scq. mane exhibeatur *potio communis purgativ.* ac deinceps eodem modo *Venæsectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit.* Interim toto decursu, si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur.

℞ *Decoct. Pectoral.* ℥ss, *Syr. Violar. cap.* *Ven. an.* ℥ij ; *f. Apozema* ; *cap. ℥ss,* *ter in die.* Item *Ol. Amygd. dulc. rec. Cochl. j,* sæpius propinetur.

℞ *Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialth. & Pomat. an.* ℥i ; *M. f. Linimentum,* quo *ingatur pars læsa manè & serò,* *superimponend. fol. Brassicæ.*

*De furfure, sive porrigine capitū.*

*Potio purgans communis bis propinetur dein.*

*Rx Ol. Amygd. Amarar. ℥ Laurini, Cinerum fol. Abrotani an. ℥i, misceantur probe & f. Linimentum, quo inungatur totum caput singulis matutinis, diligenter infri- cando, & postea superimponendo vesicam suillam.*

*At primū abradatur totum capillitium & postea defricentur squammulæ sensim singulis auroris, prout decidere pronæ fuerint.*

*De Morsu canis Rabidi.*

*Post 40 dies aut plures melancholica ad- sunt symptomata, febris, sitis, hydropho- bia, & tandem partium extremarum con- vulsio.*

*Rx Sp. vin. optimè rectificat. ℥iv. Theriac. Andromach. ℥i, f. mixtura, qua illinatur pars læsa ter in die, superimponendo linteum eadem mixturâ imbutum.*



*De Ulcere Vesicæ.*

Pus graveolens, aut sanguis nonnunquam squammulæ seu pelliculæ membranacæ ac veluti fursuracæ crustulæ (sin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulæ, aliquando crassiores) unà cum urina excernuntur, perpetua dysuria & continuus earum partium dolor infestant; renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ & doloris dantur intervalla, pus etiam excrementum copiosius est, album, leve & minimè foetidum, lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

℞ Emplast. Flor. unguent. dict. ziss; f. Pil. N° ix; cap. iij, horis medicinalibus, superbibendo sequentis Aq. Cochl. vj.

℞ Rad. Fœnicul. Consol. Aristoloch. & Caryophyll. an. ziiij, fol. Agrimon. Hyper. Bugul. Sanicul. Plantag. an. M. vj, incidantur minutim, & destillentur in vini alb. & lact. an. ℥iv, & eliciantur solummodo ℥iv. pro usu.

℞ Pulv. Rad. Consolid. maj. & gumm. Arab. an. zi, Sacchar. Penid. zij; f. Pulv. cap. Cochl. j, bis in die.

De

*De Asthmate inveterato in iis, qui sanguine temperamento præditi sunt.*

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorque est spiritûs tractio ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda: Asthma, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis, violenter, moventur, cum stertore & sibilo. In priore specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia opplicantur: Et Orthopnœam, quæ est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotantes non nisi sedentes, & erectâ, cervice respirare possunt. Musculi etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 3℥. Die sequenti sumat *portionem purgativam communem*, quæ reperatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis sumat sequentia.

℞ *Sem. Anis. subtiliss. pulv. ʒij. cum s. q. Balsam. Lucatell. f. pil. ex singulis drachmis vj, cap. iij, manè & quintâ pomeridianâ, superbibend. decocti Amari sine purgantibus ʒiv. calidè.*

Si

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

*De paralyfi.*

Sensus & motus in partibus quæ afficiuntur, vel simul, vel alterutra tantum facultas aut prorsus extinguitur aut vitatur.

Sumat *pil. Coch. min. ʒij.* alternis matutinis per *vj.* vices; deinde capiat ter in die per *xxx* dies *Electuar. Antiscorbutic. ʒij.* superbibend. *Aq. Antiscorbutic. Coch. vi.* Vide in scorbuto.

℞ *Unguent. Nervin. ʒiii, Sp. Lavendul. comp. ℥ Sp. Coch. hortens. an. ʒiss, M. & inungantur partes affectæ, ut spina dorsi, &c. manè & serò.*

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solum destinari videantur; attamen cum humores crudos ac fixos volatilifare præ aliis apta nata sunt, in Paralyfi etiam conveniunt.

*De tussi, & Phthisi.*

Tussis per se patet. Phthisis autem invadit ab ætatis anno 18 ad 35. Extenuatur totum corpus. Febris molestat hæctica, à cibo invalescens (quæ ex celeritate pulsus, rubedinèq; genarum dignoscitur) materia per  
tussim



tussim excreta cruenta est aut purulenta, in ignem coniecta tetrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, fundum petiæ Sudores nocturni superveniunt, livescunt tandem genæ, facies pallet, exacuantur nares; temporum quoque collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequituram denunciant.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim aut alia signa Peripneumoniam notham committantia, accersiverit, vel si à Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, malè curatis eadem nequius quam orta fuerit, satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis abstinereat, & his similibus remediis ad libitum utatur.

*Balsamum sulphuris Anisatum ad gutt. x. Coch. i. Sacchar. crystall. instillatum bis vel ter in die devoretur; ut etiam Tabellæ sequent. quas secum æger continuo portet, unam frequenter assumat.*

*R. Sacchar. cand. lbss, coq. s. q. Aq. font. usque dum adhaereat extremis digitor. tum adde pulv. Glycyrrhizæ, Enul. Campan. sem. Anis. & Angelic. an. ʒss, pulv. Irid. Florentin. Sulphur. an. ʒij, Ol. Chym. Anisi ʒij; f. s. a. Tabellæ domesticæ vocand. atque hoc interim Eclegmate utatur.*

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij, Syr. cap. Ven.  
 Violac. an. ℥i, Sacchar. cand. q. s. f. Lobeck.  
 de quo sæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ,  
 quando tussis urget.

In defluxione tenui *Eclegmata incrassantia*  
 exhiberi poterint.

Sin verò Tussis his remediis haud cessaret (præcipuè autem si febrim comitem habeat, vel si à Peripneumonia aut Pleuritide originem ducat) tum ineptum fuerit pectoralibus fidere; sed Venæsectione & Catharsis debellanda est, ut in methodo, quæ in curatione Peripneumoniæ nothæ describitur.

Verùmenimverò cùm, his omnibus non obstantibus, Tussis non modò non curationi cessarit, sed & diurnâ Palmonum concussione eos adeò debilitaverit, ut Phthisis tandem subingressa fuerit, tum hâc methodo procedendum.

℞ Balsam. peruv. gutt. x, instillentur  
 Cochl. j, Syr. Hederae terrestris, vel si id minus gratum fuerit ægro, Cochl. j, Sacchar. crystall. cap. ter in die superbibendo Decocti Amari sine purgantib. ℥iv, vel (si idem ventrem moverit) ℥iij.

Sed

Sed omnibus aliis ( quotquot adhuc inventa sunt ) *Equitatio* ad satis longa & diutina itinera facilè palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quàm si puer aut juvenis esset, & sanè haud multò certius Cortex Peruv. feбри intermittenti, quàm in hac ætate *Equitatio Phthisi* medetur.

#### *De Scorbuto.*

Adsunt spontaneæ lassitudines, corporis gravitas, dyspnœa, præcipuè ex motu corporis, gingivarum putrefactio, oris graveolentia, sanguinis è naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, crurum nunc intumescencia nunc extenuatio, in iisdem perpetuo maculæ lividæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ, faciei color plerumq; ex pallido fuscus.

Extrahatur sanguis è brachio ad *zviij*, nisi signa *Hydropis* adfuerint : Seq. mane exhibeatur Potio Purgat. communis, quæ repetatur tertiâ quâq; die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, uti etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat sequentia.



℞ *Conserv. Cochl. hortens. ℥ij, Conserv. Lujul. ℥i, pulv. Ari compos. ℥vj. cum s. q. Syr. Aurantior. f. Electuar. de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ, & nocte. superbibendo Aq. Raphan. compos. Cochl. vj. vel sequentis.*

℞ *Rad. Raphan. Rustican. raspat. ℥ij, rad. Ari ℥j. fol. Cochl. hort. M. xij. fol. Mentb. Salv. Nasturt. aquat. ℥ Beccabung. an. M vj. Sem. Cochl. hort. parùm contus. ℥ß. nuc. Moschat. ℥ß. Vin. Alb. ℥xxij. destillentur organis communib. & eliciantur solummodo ℥vj. pro usu.*

*Vel Folia Rec. Cochl. hortens. per se destillentur pro usu dicto.*

*Porro sequens cerevisia sit pro potu ordinario.*

℞ *Rad. Raphan. Rustican. recentis incisi ℥ij. fol. Cochl. hort. N° xij. passular. enucleat. N° vj. Aurant. cum toto incisi dimidium, in Lagenam vitream ℥ij. Cerevisiæ tenuis capacem subere mox probè obturandam immittantur.*

*In hunc modum parentur eodem tempore sex Lagenæ pro usu, & post aliquot dies sex aliæ, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps ; vel,*

*Vice hujus Cerevisiæ seq. mixturæ Cochl. iij, vel iv. immisceri poterint singulis haustibus potûs communis.*

℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥ sem. Cochleariens. an. ʒβ. fol. Cochleariens. M. ij. pul-  
pam unius Aurant. Contundantur simul in mor-  
tar. marm. sensim affundendo vin. alb. ʒβ. Co-  
letur cum levi expressione & reponatur pro ulu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsis  
omissis, in Rheumatismo scorbutico, sive Hy-  
sterico, valde prosunt.

### *Tabis Descriptio & Cura.*

Plures sunt Tabis species : Prima ferè ori-  
tur è frigore hyeme contracto. Paulo enim  
ante solititium Brumale quamplurimi ab in-  
gruente tempestate frigidâ, tussi tentantur :  
Quæ cum illos invaserit quibus pulmones ab-  
ortu sunt infirmiores, omnino necesse est ut à  
repetitis Tussendi conatibus magis adhuc de-  
bilitentur ; atq; ita tandem alimento sibi  
proprio assimilando, præ mala *διαθήσας*,  
prorsus impares reddantur. Hinc jam ingens  
Pituitæ crudæ copia aggeritur, quæ continuâ  
pulmonum agitatione & vehementi nisu affa-  
tim per os rejicitur. Pulmones exinde pure  
referti purulenta *μύσματα* quaquaversum in  
carnes dispergunt. Hinc enascitur Febris pu-  
trida, cujus Paroxysmus sub vesperam fatigat  
sub auroram vero sudore copioso ac vires  
imminuente solvitur. Denique ad malorum  
cumulam Diarrhœa succedit, partim ab hu-  
moribus putridis ex arteriis Mesentericis in  
inte-

intestina depositis excretisque, partim à labefactato pessundatq; vilcerum Tono. Atq; ita demum æger proximâ ætate fato suo fungitur, à morbo cui prægressa Hyems viam straverat, extinctus. Atq; hæc est præcipua Tabis species.

Porro cùm sanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, perspiratioq; à subitâ pororum contractione plus satis inhi-beatur, particulæ hæ in pulmones depluunt per interspersos Venæ Arteriosæ ramos; vel per Ductus Salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde iam humor per Atperam Arteriam delapsus in pulmones, Catarrhi ritu, eos ita jugiter irritat, ut creber & vehemens tussendi conatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus symptomata, brevi accersat. Cumq; non iam amplius naturalem sibi pulmones œconomiam statumq; tueri valeant, Glandulæ & Tubercula adnasci solent; quæ in agris ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulentâ sanie ut plurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel invaluerit hic morbus, & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcunq; potest Medicatio, minuendo causam defluxionis in pulmones, pertusâ in Cubito Venâ, Catharticis mitioribus; tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status accommodatis. Incrassantibus sc. ubi humor subtilior & tenuior vim Exultri-



cis facultatis videtur eludere : Attenuantibus vero ubi pituita crassior ægre & cum molestiâ per os rejicitur. Dein & hæctica Febris remediis refrigerantibus contemperantibusq; coerenda. Talia sunt *Lac Asininum, Aqua Lactis, Stillatitia, Emulsiones ex Amygd. dulc. Sem. Melon. Pepon. Papav. alb. Aq. Fl. Paralyf. &c.* Deniq; & curando Ulceri opera danda est ; cui rei Terebinthina illa Liquida, Opobalsamum vulgo dicta, apprimè conferre censetur.

Hujusce Morbi Curatio, me Judice hæc methodo optimè ac felicissimè institueretur. Primum educatur è brachio sanguis dein subducatur Alvus ad tres dies continuos, vel *Pil. Coch. majoribus, vel Decocto Leniente à nobis præscripto.* Tertiâ nocte exhibeatur *Syr. de Mec. ʒß.* Intermissio biduo, triduove, pro re natâ, repetatur Purgatio, idq; toties fiat quoties opus esse videatur, donec symptomata vel prorsus evanuerint vel saltem mitescant. Post singulas Catharthes jam finitas capiat Opobalsami gutt. *xx.* Sacchari particulæ majori instillatas permixtasq; nihil superbibendo. Vel *Pil. de Terebinth. ex Insula Chio cum Saccharo cando confectam.* Opobalsamum non assumendum est nisi prægressis evacuationibus debitis. Huius loco *Electuarium è Balsamo Lucatelli, Glycyrrh. pulvere, semine Anisi & Terebinthina* concinnatum poterit substitui. Post evacuationes sedulo conandum est ut Tussis sedetur, ne Pulmones jugi agitatione infirmiores evadant.

dant. Huc facit præ cæteris Syrupus jam laudatus, qui hac formula possit usurpari, *R Decoct. Pectoral. ℥j. Syr. de Mecon. Syrup. Capill. Ven. an. ʒij. Cap. Cochl. v. ter in die.* Medicamentum hoc ita frequenter haustum catarrhum in Pulmones depluentem paulatim filtet; eosq; in pristinam *εὐεξίαν* reducet nisi jampridem à naturali statu nimium recesserint. Promovebit insuper purulentæ materiæ in iisdem aggestæ concoctionem.

At vero Palmarium hujusce Morbi præsidium est, ut Æger quotidie Equo vehatur. Et qui se huic corporis exercitio sanandum tradit nullis jam Diætæ legibus adstrictus, nullo Cibi potusve genere privandus est: cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur. Quibusdam eorum qui ex hac methodo convaluere tumor in collo exortus est non multum à Scrophulis abludens.

Est & alia Tabis species à Tussi prognata, longè diverso anni tempore, initio sc. ætatis. Hæc Juvenes persæpe illos invadit qui debiliore sunt corporis habitu, & quorum sanguis particulis calidis acribusque refertus est. Sanguinem isti è pulmonibus pertussim exantlant, nimio meri potu prius excalescenti. Ægri dolorem sive ægritudinem quandam in pulmonibus persentiscunt: Quæ Symptomata nisi maturè remediis appropriatis eliminentur primo scabrities, mox & ulcus accedit, unde pus confectum demum expuitur.



Dicta jam Tabis species Venæsectione & Catharsi bis alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur : Si Diætâ insuper Refrigerante & Incrassante utatur æger & à carnibus in solidum abstineat.

Tertia hujus Morbi Species ortum debet materiæ Febrili in pulmones Febre jam fatiscente, amandatæ ; qui sensim infirmiores redditi à symptomatis jam memoratis vexantur.

Quandoq; oritur à sanie istâ purulentâ quæ à Pleuriticis non satis copiosè per expectorationem egeritur. Quoin casu eandem quam Empyema, Curationem postulat.

Sunt etiam qui à nimis copiosis, & debitorum frequentioribus evacuationibus debilitati in quartam Tabis speciem præcipitantur. Hoss calor Hecticus à Cibo potuq; sumpto, sub noctem laceffit : Atq; hos præ cæteris Aphthæ infestant.

#### *De Podagra.*

Exeunte Januario. aut incipiente Februario ingruit horâ ferè secundâ matutinâ, dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoq; vero calcaneum, suram ; aut talum, mox sequitur rigor cum horrore, & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur, (& pari passu rigor atq; horror recedunt) idq; in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, nunc tensionem violentam, nunc morsum canis rodentis, quandoq; pressuram,



ram, & coarctationem exprimens, hinc præ ex-  
 quitito dolore, nec linteorum superincumben-  
 tium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulati-  
 one concussionem ferre Podagricus valeat;  
 dolor non sedatur, nisi ante horam secundam,  
 tertiamve matutinam, (decurso scilicet nycthe-  
 meri spatio à primo appulsu) & jam lenima-  
 dore perfusus æger somno concedit, à quo evi-  
 gilans, dolore multum imminuto, partem af-  
 fectam tumore recenter occupatam cernit. Se-  
 quenti die, fortè etiam ad biduum, triduumve  
 dolet nonnihil pars affecta, idq; vehementius  
 ad vesperscente die, levatur autem sub galli  
 cantu. Intra paucos dies alter Pes eodem do-  
 lore torquetur. Postquam utrumq; pedem  
 exercuerit dolor, qui sequuntur Paroxyismi  
 abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis,  
 tum durationem; atq; ex serie horum paro-  
 xymulorum, constat paroxysmus, qui dicitur  
 Podagræ diuturnior breviorve pro ægri ætate  
 in iis qui vegetiores sunt & quos Podagra ra-  
 rius invasit, diebus sæpe quatuordecim, in seni-  
 oribus, atque iis quos sæpius afflixit, duobus  
 mensibus ferè desinit, iisve: ò, qui vel annis, vel  
 diuturniore morbi mora fracti sunt, non prius  
 valedicit quàm æstas iam adultior eam fugaverit.

Ad quatuordecim Primos dies urina colo-  
 rator est, cum sedimento rubro, & quasi are-  
 nulis repleta, alvus ferè constipata est. *Appe-  
 titus* prostratio, rigor totius corporis sub ve-  
 speram, integrum Paroxysmum comitantur,

recedentem Paroxysmum excipit pedis affecti inter digitos pruritus vix ferendus, unde decidunt furfures, & pedes desquamantur.

Haecenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, cum verò vel ab indebita medicatione turbatur Podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi fomitem pervertitur, jam manus, carpos, cubitos genua, aliasq; regiones occupat, quandoq; unum, pluresve digitos distortuens, fasciculo radicum pastinacæ similes eos reddit, motu paulatim privans, tandemq; concretiones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam, vel oculos cancerorum æmulantes, nonnunquam in cubitis tumorem subalbum ciet, ferè ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur cum rubore, nonnunquam femur occupans, sensum exhibet, quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acrius urget, artus jam habet æger ferè undequaq; contractos, & impeditos, ita ut claudiceret, & permolestè proreperit. Urina illam colore imitatur, quæ in diabete excernitur, dorsum, aliasq; partes molestè pruriunt, maximè sub horam somni.

Post multos, dirosq; cruciatus Paroxysmi subsequentes (naturâ partim onere materiæ peccantis partim senio oppressâ) ægrum quoad dolorem clementius tractant, at loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoq; etiam propensio



penſio ad diarrhœam ſuperveniunt, quæ ſymptomata evaneſcunt, quories articulos dolor fatigat, atq; ita nunc dolore, nunc ægritudine, quaſi alternatim laceſſentibus, Paroxyſmus longas moras neſtit.

Calculus Renum in quamplurimis parit hic affectus.

Fœminas perraro infeſtat, eaſque, non niſi jam vetulas, & viragines, pueros quoque, & juvenibus minores vix adoritur.

Indicatio Curativa in eo vertitur, ut coctioni conſulatur, indigeſtionibus ſublatis, ſeu fit per Pharmaca, ſeu victûs rationem, ſeu exercitationem, ſeu alia ex iſtis quælibet, quæ ſex res non-naturales indigitantur.

Venæſectio, Catharſis, ac Diaphoreſis ſcopum non attingent, licèt iis qui *Renum* ſimul *Calculo*, & exindè orto *Mictu ſanguineo* laborant, non abs re erit, ſemel in ſeptimana, alvum *Mannâ* ſubducere, & ſingulis noctibus, poſt Purgationem Paregoricum exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi ſatiſfaciunt, ea ſunt, quæ moderatè calent, & vel amaricant, vel linguam leniter feriunt, talia ſunt, *Rad. Angelic. enulæ, fol. Abſinth. cent. min. cham. chamæp. &c.* quibus addi poſſunt *Antiſcorbutica* dicta, ut, *Rad. raph. ruſtic. fol. Cochl. hort. naſturt. Aq. &c.* quæ tamen parcius uſurpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeos ſubdunt, & calorem augent, præ iſtis aliis, quæ miti calore, atq; amaritudine, ventriculum corroborant. Haud inutile eſt *Electuar.* ſequens.

R Con-



℞ *Conserv. cochl. hort. ʒiʒ, Absinth. rom flav. Aurant. an. ʒi, Angel. condit. nuc. mosch. cond. an. ʒʒ. Theriac. Androm. ʒiij. Pulv. ari comp. ʒij. cum s. q. Syr. Aurant. f. Elect. de quo sumat. ʒij. bis in die superbibendo seq. Aq. destillat. Cochl. v. vel vj.*

℞ *Rad. raphan. rustic. incis. ʒiij, Cochl. hort. M. xij. nasturt. Aq. becabung. salu. menth. an. M. iv. cort. aurant. N° vj. nuc. mosch. cont. N° ij cerev. Brunsvicens. ʒxij. destillentur organisi communibus, donec solummodo ʒvj. aque eliciantur pro usu.*

Hæc autem remedia *digestiva*, constanter, atq; omni adhibitâ diligentîâ, assidue usurpanda, & in *paroxysmorum* intervallis præcipue in usum revocanda sunt.

Mediocritas ea in cibo observanda est, ut neq; plus alimenti ingeratur, quam ventriculus concoquere valeat, neq; è contra nimîâ, abstinentiâ, partes eâ proportionè alimenti defraudentur, quæ earundem robur & vigorem sustinere potis est. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato consulendum est, & unica ciborum specie singulis passibus vescatur, de cæteris, demptâ carne, prohibitu comedat, modo nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis. Prandere tantum expedit, loco autem coenæ indulgeat sibi, haustum cerevisiæ alicujustenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi sunt, qui neq; ad vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore suo lædant ventriculum, depri-

muntur.

muntur. Hujusmodi est *Cerezisia tenuis Londinensis* aut multa aqua, cum pauco vino permixta, aqua autem pura & cruda periculosa est, cum autem universa ferè corporis substantia, in podagram degeneraverit, à liquore quocumq; fermentato quantumvis leni, & tenui abstineat, & utatur *Decocto Dietetico ex Sarsa*, in remediis formulis descripto, ubi primum à paroxysmo convalescit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger à longo, & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate proveciore, vel deniq; præ nimia debilitate, cibos absq; vino nequeat consequere, in partibus laustum vini Hispanici sibi indulgeat, *Apozema Dieteticum* abdicans.

Æger maximè hyemis tempore, maturè lectum petat, diluculo exor gat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis, cæteris vero omnibus, exercitatio corporis quotidiana, facile palmam præcipit, quæ moderata sit. & perseverans, nullo autem modo justo vehementior; quoad exercitii genus quoties nec grandior ætas nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua in aere salubri, aut vectio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat. Remedia externa nulla adhibenda

Quamvis nihil magni in paroxysmo tentandum sit, conducet tamen fortasse per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur, à carnibus abstinere jussulo uri avetaceo, aut alio pari alimento; sin autem spiritus animales iraxiam concipere apti sunt, non expedit à carnibus abstinere diutius; quam ventriculus earum usum averteat ne quid autem vel in quantitate, vel in qualitate ciborum aut potus peccet.

Sym-

Symptomatis his occurrendum est, à quibus æger in paroxysmo de vita periclitatur, horum maxime familiare est, ventriculi languor, cum ventris torminibus, tanquam à flatu, hoc in casu, nihil æq; votis respondet, ac vini Canariensis haustulus subindè deglutitus, exercitio uratur æger; si autem symptoma, inducias haud ferens, mortem minuitur, modo caput malum non impetat, ad *Laudan.* statim confugiendum, *viz. gutt. xx.* in haustulo *Aq. Epidem.* & in lecto ad quietem se componat. hâc ipsâ methodo, i.e. ab imminente morte liberavit autor clarissimus ubi ex errore aliquo, circa res sex non-naturales, in ingentem ventriculi ægritudinem incidit, cum vomituritione, & aliquali ventris dolore, artus interim, ex retrocessione materiæ Podagricæ, doloris erant expertes, ac ad motum plus solito habiles, Congium nempe unum liquoris passetici, vel cerevisiæ tenuis devorabat, & quamprimum totum per vomitum rejecerit, Vini Canar. haustulum, cui instillatæ fuerint *Laudan. liq. gutt. xviii.* sumebat. quod si huic remedio symptoma non cedat, sudor provocetur, methodo & medicamentis huic usui dicatis; ad biduum, triduumve, manè & vespèr per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantis in Pulmonum lobos; liberatis artubus à dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma, pari modo ac Peripneumonia absoluta, venæsectione scilicet repetitâ, diætâ, & remediis, refrigerantibus, & incrassantibus, purgandus est insuper æger, inter venæsectiones, potionibus lenientibus, sudoris autem provocatio obest.

FINIS.



Equitatis, aut beatio  
in curru pag. 107.

101: 12 :

Contax feru. 12.

fig. post. & water hand  
to be taken off.

posterior a 31.

by: symmetrical. 31.

St. Ingrident. Decol. post.

31. 2. 31.

31. 31. 31. 31. 31.

St. by fast. alex. 31. 31.





Cuscuta  
Hyssop.  
capr. ven.  
scabiosa  
4 pectoral.

3℥ of Syr. to a quart.

Dose: 100 grains.

℞ sacch. alb. 3℥ iiii

℞ sacch. benz. 3℥ i

coriand. 3℥ xvi

℞ powder.

to be put into a quart

of spring water boiling

hot: let it boil a

little while & pour

it: pour it of

for use.

℞ powder.



~~... von ...~~  
~~... in ...~~  
~~... mit ...~~  
~~... Ball.~~

12m. 11m. 10m. 9m. 8m. 7m. 6m. 5m. 4m. 3m. 2m. 1m.

Carthagen.  
Hannover.  
Cunin.

flor. Japhur.  
sacchar. cand. a

puteris.  
suc. liquor. h. 21

visio. m. Vin. alb. 21  
Syrup

ofa. m. 21 a

28m. 27m. 26m. 25m. 24m. 23m. 22m. 21m. 20m. 19m. 18m. 17m. 16m. 15m. 14m. 13m. 12m. 11m. 10m. 9m. 8m. 7m. 6m. 5m. 4m. 3m. 2m. 1m.

f. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

John ~~7~~

ad Colicam

ol. garyoph. gut VI  
dropt upon sugar  
taken in 13 day.

Julap. refriger

Bar. Juniper

Caru

Cordia

Sem. am.

Caustiva.

Er



